

Alte Prüfungsfragen Falknerei

von den Jahren 2016 - 2024

1. Greifvogelkunde:

1.1 Wir wurden vor die Vitrinen geführt: Welche Greifvögel kennen Sie?

-> selbstverständlich

Antwort: hoffentlich alle

1.2 Ein Präparat war ein Rothabicht (mit Eichelhäher als Beute). Gibt es noch einen anderen Vogel in der Vitrine, der als Jungvogel als „Rot“Vogel bezeichnet wird?

-> Junger Wanderfalke - dabei wurde illustrativ auf einen anwesenden lebenden Jungvogel und dessen getropfte Brust verwiesen.

Antwort: Der junge Wanderfalke wird auch als Rotfalke bezeichnet.

1.3 Ist der gezeigte Baumfalke männlich oder weiblich? Woran erkennen Sie den Unterschied?

-> schwarze Striche auf den roten Hosen nur beim Weib

Antwort: Adulte Baumfalken haben rostrote Hosen.

Die Weibchen mit dunklen Längsflecken.

Die Männchen haben keine dunklen Längsflecken.

1.4 In einer anderen Vitrine wurde auf einen Sprinz verwiesen - woran erkennen Sie ihn?

Antwort: Das Männchen oder der Sprinz ist deutlich kleiner und wiegt nur etwa die Hälfte vom Weibchen. Die Unterseite beim Sprinz ist rostrot mit schwärzlicher Querbänderung während die Unterseite des Weibchens weiß mit schwärzlicher Querbänderung ist.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

1.5 Erkennen weibliche Rohrweihe - beschreiben sie den zugehörigen Terzel.

Antwort: **Das Weib** ist fast einheitlich dunkelbraun und nur Scheitel und Kehle gelblichweiß.

Der Terzel ist dunkelbraun mit grauen Flügeln die an den Spitzen schwarz sind, der Schwanz ist hellgrau, der Kopf und Hals hell rostgelb mit dunkelbrauner Strichelung.

1.6 Erkennen Schwarzmilan und Rotmilan - Unterschiede im Flugbild, welcher ist Zugvogel und warum?

-> Schwarzmilan wg. Fische als Beute (sind im Winter wg. zugefrorener Gewässer schlecht zu bekommen)

Antwort: **Der Rotmilan** hat einen langen tiefgegabelten rostroten Schwanz, lange, oft gewinkelte Flügel die auf der Unterseite im Handbereich ein weißes Feld zeigen, Kopf ist hellgrau.

Der Schwarzmilan hat einen kürzeren und weniger gegabelten Schwanz, lange aber ziemlich breite Flügel, Gefiederfärbung überwiegend dunkelbraun nur Kopf meist deutlich heller mit dunkler Strichelung. Zugvogel – Afrika, südlich der Sahara

1.7 Vorlage von ca. 8 Federn (Juv. Wanderfalke, adult. Wanderfalke, Mäusebussard, Wespenbussard, Habicht, Turmfalke, Sakerfalke, Gerfalke) - suchen Sie die Falkenfedern heraus - welcher Falke ist das jeweils?

-> Überraschend war die Mauserfeder des (anwesenden) jungen Wanderfalken - restl. Falkenfedern waren eindeutig

Antwort:

1.8 Vorlage eingeschweißter Bilder der Terzel (wurde gesagt) der 4 (!) Weihen. Erkennen und zuordnen

(-> das Bild der Rohrweihe war eher mäßig gut zu erkennen, da von schräg oben fotografiert). Unterschied Wiesenweihe zur Steppen(!)weihe

-> Anzahl der „Finger“

Antwort: **Steppenweihe:** Unterseite schneeweiß, Oberseite hellgrau, schwarzer Keil an Flügelspitzen unten und oben, Anzahl der Finger 3

Kornweihe: Unterseite schneeweiß, Oberseite hellgrau, Kopf und Hals hellgrau, schwarze Flügelspitzen unten und oben, reinweiße Oberschwanzdecken, Anzahl der Finger 4

Wiesenweihe: Kopf, Rücken und Brust aschgrau, Unterseite weißlich mit rostbraunen Längsstreifen, schwarze Flügelspitzen, auf den Armschwingen 2 schwarze Querbänder oben und unten, reinweiße Oberschwanzdecken, Anzahl der Finger 3

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Rohrweihe: Rücken und Schultern dunkelbraun, Flügel grau und an der Spitze schwarz, der lange Schwanz ist hellgrau, Kopf und Hals sind hell rostgelb mit dunkelbrauner Strichelung, Bauch und Schenkel rostbraun.

1.9 Vorlage Bild von Fuß und Hand je eines BV - Benennung der Unterschiede, danach sämtliche Merkmale von Falken aufzählen

Antwort: **Fuß:** Körperteil eines Griffjägers zum Zupacken und Töten, Ständer stark mit starkem, kräftigen Fang (Fuß), kräftige Zehen mit starken und langen Klauen

Hand: Körperteil eines Bißjägers nur zum Festhalten, Ständer dünn mit schwachem und feingliedrigem Fang (Hand), lange und schlanke Finger mit kleineren, spitzen Klauen

Merkmale von Falken: Reißhakenbeißschnabel mit Falkenzahn, rundes Nasenloch mit Nasenkorn, dunkle Iris, schwache Ständer mit filigranen Händen, Finger mit unterseitigen Haltenoppen

1.10 Vorlage Bild mit Fischadler und Seeadler- benennen der Besonderheit des Fischadlers

-> gefragt: Wendezehe

+ Wie trägt er seine Beute?

+ Was ist der Unterschied zwischen der Jagdweise des Fischadlers und des Seeadler

-> Fischadler taucht

Antwort: **Fischadler:** Nahrungsspezialist ernährt sich fast nur von Fisch hat keinen Kropf, schlitzförmige und verschließbare Nasenlöcher Wendezehe (Außenzehe), kräftige Zehen mit stark gekrümmten Krallen und scharfe, dornenartige Schuppen an der Unterseite der Fänge zum Festhalten der Fische, taucht zum Fischfang anteilig komplett unter Wasser und ergreift Fische in bis zu 1m Wassertiefe, er trägt die Beute in Flugrichtung

Jagdweise Fischadler vs Seeadler:

Der Seeadler ergreift Fische nur an der Wasseroberfläche und taucht mit dem Körper nicht ein

1.11 Vorlage von 4 schwarz/weiß/grau quer gebänderten (eingeschweißten) Federn. Welcher BV bevorzugt diese Beute

-> Taubenfedern (war eindeutig) - BV = Wanderfalke als reiner Vogeljäger

Antwort: Der Wanderfalke als reiner Vogeljäger

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

1.12 Mäusebussard, Raufußbussard - nur bestimmen

Antwort: **Mäusebussard:** helles Brustband,
dunkle Endbinde mit weiteren 8-10 schmale
dunkle Querbänder auf dem Stoß,
Raufußbussard: scharf abgesetzte schwarzbraune Flecken
beidseitig an den Handwurzeln,
dunkles Bauchschild,
heller Stoß mit einer breiten hellgerandeten
aber dunklen Endbinde beim Weibchen – beim
Männchen noch 2-3 weitere schmale Endbinden

1.13. Habicht und Rothabicht - Gibt es einen weiteren Greifvogel welcher im juvenilen Kleid Rotvogel genannt wird? Welcher?

Antwort: Der junge Wanderfalke / Jungfalke oder Rotfalke

1.14 Wanderfalke (adult) - nur bestimmen

Antwort: dunkler Oberkopf,
breiter schwarzer Backenstreif,
weiße Kehle,
Unterseite hell mit dunkler Querbänderung bzw. kleinen dunklen Tropfen,
Oberseite blaugrau

1.15 Wespenbussard - woran erkannt?

Antwort: Kopf klein, taubenähnlich und ohne Augendach,
Kopf beim Männchen hellgrau – beim Weibchen dunkelbraun,
Iris leuchtend gelborange,
schlitzförmige Nasenlöcher in grauer Wachshaut,
Stoß mit einer breiten dunklen Endbinde und zwei breite dunkle Binden
im Bereich der Schwanzwurzel,
Gefiederfärbung oberseits braun und unterseits weißlich, variierend

1.16 Steinadler - Vorkommen und Beutespektrum?

Antwort: **Vorkommen:** Westeuropa und Nordafrika, ostwärts bis Kamtschatka
und Japan, von Alaska und Kanada über West-USA
bis Mexiko,
Beutespektrum: Murmeltiere, Gams-, Steinbock- und Rehkitze,
Schneehasen, Raufußhühner, Fallwild, Feldhasen,
Katzen, Landschildkröten, Igel

1.17 Baumfalke - männlich oder weiblich bzw. woran kann man dies erkennen?

Antwort: äußerlich nicht zu unterscheiden (?????)

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

1.18 Sperber - Es handelt sich um den Sprinz - woran erkannt?

Antwort: **Sprinz:** ist deutlich kleiner und leichter als das Weib,
Oberseite blaugrau bis dunkel schiefergrau,
Unterseite rostrot quergebändert
(Weib: oben braungrau, unten schwärzliche Querbänderung)

1.19 Gerfalke, weiße Morphe - gibt es auch andere Farbmorphen?

Antwort: Ja, von fast weiß über graubraun und grau bis nahezu schwarz

1.20 Sakerfalke - woran erkannt?

(Stand mit Stoß zum Betrachter — „Sakeraugen“ sichtbar)

Antwort: an den Sakeraugen (weißliche kreisrunde Flecken)

1.21 Weibliche Rohrweihe - wie sieht eine männliche Rohrweihe aus?

Antwort: **Weibchen:** fast einfarbig dunkelbraun,
nur Scheitel, Kehle und Flügelbug gelbweißlich,
Männchen: Rücken und Schulter dunkelbraun,
Flügel grau und an den Spitzen schwarz,
Stoß hellgrau,
Kopf und Hals hell rostgelb mit dunkelbrauner Strichelung

1.22 Federn: Aus 8 Federn auf dem Tisch die vier Falkenfedern herausuchen und Falken benennen (Saker-, Turm-, Ger- und juveniler Wanderfalke)

Antwort: („Die Greifvögel“ von Mebs – üben!)

1.23 Rötel- und Turmfalke - Unterschiede?

(„Punkte auf Flügeldecken, längere Hand- und Stoßpennen im Flugbild bei Rötelfalke; Rötelfalke ist Koloniebrüter)

Antwort: **Rötelfalke:** 10. Handschwinge gleich lang wie die 8.(=rundlich),
beide mittleren Staartpennen 2 cm länger als die
anderen und überragen im Flugbild,
Koloniebrüter,

Turmfalke: 10. Handschwinge deutlich kürzer als die 8. (=spitz),

1.24 Kurzfangsperber und Sperber - Unterschiede? Warum kürzere Fänge?

Antwort: **Kurzfangsperber:** Augen / Iris dunkelbraun,
Flügelspitzen schwarz,
Männchen unterseitig hell rostrote Querbänder,
Weibchen unterseitig kräftig rostrote Querbänderung,
Weibchen nur 9% größer/schwerer als Männchen,
kurze Zehen

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Sperber: Augen / Iris gelb, gelborange bis orangerot,
Männchen unterseitig rostrote Querbänder,
Weibchen unterseitig schwärzliche Querbänderung,
Weibchen etwa 50% größer/schwerer als Männchen,
Lange dünne Beine und lange Zehen

Kürzere Fänge weil: ????

1.25 Rotfußfalke und Merlin - Brüten diese bei uns? Wann können wir sie bei uns sehen?

(Merlin = Wintergast; Rotfußfalke nur beim Frühjahrszug)

Antwort: Nein, beide brüten nicht in Deutschland

Rotfußfalke: brütet im südöstlichen Europa, Ukraine und Südrussland und ist im Winter in den Savannen Ost- und Südafrikas, er erscheint regelmäßig auf dem Frühjahrszug in Gesellschaft mit den Baumfalken in Süddeutschland.

Merlin: brütet im nördlichen Europa und ist im Winter in Afrika, er zieht im März/April vom Süden nach Norden und im September/Okttober/November vom Norden nach Süden, in diesen Zeiten sieht man ihn als Durchzieher oder auch als Wintergast in Deutschland.

1.26 Fischadler und Seeadler - Spezielle/ Spezifische Merkmale und Unterschiede bei der Jagdweise? (Fischadler taucht in Wasser ein, Seeadler nimmt Fische von Wasseroberfläche)

Antwort: **Fischadler:** Nahrungsspezialist ernährt sich fast nur von Fisch, hat keinen Kropf, schlitzförmige und verschließbare Nasenlöcher, Wendezehe (Außenzehe), kräftige Zehen mit stark gekrümmten Krallen und scharfe dornenartige Schuppen an der Unterseite der Fänge zum Festhalten der Fische, taucht zum Fischfang anteilig komplett unter Wasser und ergreift Fische in bis zu 1m Wassertiefe, er trägt die Beute in Flugrichtung, Zugvogel (Mittelmeerraum, südl. der Sahara),

Seeadler: kräftiger gelber Schnabel, nur bis zur Hälfte befiederte kräftige gelbe Läufe, der Seeadler ergreift Fische nur an der Wasseroberfläche und taucht mit dem Körper nicht ein, Standvogel.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

1.27 Geier: Auswilderungsprogramm, Warum genau der Bartgeier, Brutgeschehen, Beuteamplitude, Vorkommen, Gefährdungen

*Antwort: **Auswilderungsprogramm:***

1973 Nachzuchterfolg im Innsbrucker Alpenzoo und Gründung einer internationalen Gruppe mit dem Ziel der Wiederansiedlung des B. in den Alpen,

1986 Beginn Auswilderung in den Hohen Tauern, bis 2019 wurden 227 Bartgeier freigelassen – 63 davon in Österreich,

Seit 2021 Auswilderung in Nationalpark Berchtesgaden – Jährlich 2 Junge

Stand 2020 leben rund 220 Bartgeier in den Alpen

Warum der Bartgeier:

Weil der B. früher im gesamten Alpenraum heimisch war

Beuteamplitude:

Seltener Beutefund, viel auf einmal Fressen, wenig Wasser in Haut und Knochen – viel Wassers schöpfen,

Knochen werden auch in Depots angelegt für Schlechtwetterphasen, bei Aasknappheit auch lebende Schildkröten (fallenlassen)

lange Fastenperioden,

Vorkommen:

in den Hochgebirgsregionen von Nordwest-Afrika, Spanien,

Alpenraum, Balkan über Zentralasien bis Mongolei und China,

Gefährdung:

Vergiftung, Abschuss, Stromleitungen und Störungen am Horst

**1.28 Präparat Schwarzmilan: erkennen, Milane allg., Zugvögel
Zugvögel: Welche, warum, wohin?**

*Antwort: **Schwarzmilan:** mittelgroßer Vogel, Körperlänge etwa 55-60cm, überwiegend dunkelbraun nur Kopf meist deutlich heller mit dunkler Strichelung, schwach gegabelter Stoß,*

Milane allg.: *im Flug etwas gewinkelte Schwingen, gegabelter Stoß, Horst ausgepolstert mit Lumpen, Papier, Plastikfetzen und Fellresten,*

Zugverhalten: *Rotmilan zieht meist nach Südwesteuropa – manche aber auch Standvögel, Schwarzmilan ist zieht im Winter nach Afrika südl. der Sahara.*

1.29 Weihen: Beschreiben und erkennen auf Fotos, als mittelprächtig vergrößerte Flugbilder - sehr schwierig. (Empfehlung für die Zukunft mit den Schülern die Weihenfotos in den einschlägigen Büchern ansehen und vergleichen.)

Antwort: im Flug etwas gewinkelte Schwingen, mehr oder weniger gegabelter Stoß, ausgesprochener Segelflieger und steuert viel mit dem Stoß

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

1.30 Geier: Arten, Lebensraum, Vorkommen, Bestände, Brutverhalten (wo, Einzel/ Kolonie), Nahrung finden, Nahrung verwerten, Gefährdung

Antwort: **Arten:** Mönchsgeier, Gänsegeier, Bartgeier, Schmutzgeier,
Lebensraum: sind freie abwechslungsreiche und zivilisationsarme Landschaften mit gutem Vorkommen an großen Wild- und Nutztierbeständen, Trockengebiete, Halbwüsten, Hochgebirgsregionen,
Vorkommen: Spanien, Südeuropa, Korsika, Kreta, Türkei, Kaukasus, Indien, Ostafrika
Bestände in EU: Mönchsgeier 1600 Brutpaare, Gänsegeier 2400 Brutp., Bartgeier 320 Brutp., Schmutzgeier 2000 Brutp.
Brutverhalten: lebenslange Paarbindung, Trios mit 1x w + 2x m möglich, reviertreu, Brutreife mit 4-8 Jahren, Horstbauer, meist in Nischen von Felswänden oder auf hohen Bäumen, Gänsegeier und Mönchsgeier sind auch Koloniebrüter, verwenden Horst über viele Jahre, nur 1 Ei (Bartgeier und Schmutzgeier 2 Eier), nutzen auch gemeinsame Schlafplätze,
Nahrung: Kadaver von abgestürzten oder verendeten Großtieren, Lawinenopfer, alles wird verwertet, giftige Krankheitserreger werden im Verdauungstrakt neutralisiert, Knochen durch starke Magensäure verdaut (BG)
Gefährdung: durch Umweltgifte, illegale Verfolgung, Lebensraumverlust, Abholzung alter Baumbestände, geringes Nahrungsangebot durch Kadaverbeseitigung.

1.31 Flugbilder: Milan, Habicht, Wanderfalke, Adler versch. Altersstufen, Sperber, Weihen

Antwort: lernen !

1.32 Situation Schelladler/ Schreiadler, Bestand, Bestandsverbesserungen

Antwort: **Schelladler:** < 1.000 Brutpaare in EU, Bestand betroffen !
Weltbestand < 3.000 Brutpaare,
Bestandsrückgang seit etwa 1970 um 80%,
Gründe: Vergiftung durch chemische Bekämpfung der Schermaus (Krankheitsüberträger) in Russland, Abholzung und Trockenlegen von Feuchtgebieten,
Schutz: Lebensraumschutz in Brut- und Überwinterungsgebieten,
Schreiadler: 15.000 Brutpaare in EU, Bestand gefährdet !
Weltbestand < 30.000 Brutpaare,
Gründe: Zerstörung und Zerschneidung von Bruthabitaten und menschliche Verfolgung.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Schutz: Lebensraumschutz in Brut- und Überwinterungsgebieten, Verhinderung der Zerschneidung von Lebensräumen.

1.33 Wanderfalken: Felsbrüter/Baumbrüter, Bestandsentwicklung,

Antwort: WF sind von Haus aus Felsbrüter, nur in den Tiefebene in Norddeutschland, Polen, Weissrussland und Russland gibt es auch Baumbrüter-Populationen die während der DDT-Ära fast völlig erloschen sind. Mittlerweile sind auch bereits Bodenbruten aus Schweden, Finnland, Estland und Russland bekannt. 1950–1974 Bestandsrückgang um 90% wegen Umweltgiften und DDT. Seit dem DDT- und Pestizid-Verbot erholt sich der Bestand wieder.

1.34 Präparate: Milanfeder, Sperberständer

Antwort: (featherbase – lernen)

1.35 Gefiederkunde - Federn von div. Greifen und Eulen erkennen

Antwort: (featherbase – lernen)

1.36 Eier von Wanderfalke, Habicht und Steinadler erkennen

Antwort: **Wanderfalke:** klein, rund, dunkelbraun marmoriert,
Habicht: mittelgroß wie kleine Hühnereier, oval, weißlich, fast gar keine hellbraunen Sprengel,
Sperber: klein, rund, weißlich mit wenig braunen Sprengel an einer Polkappe
Steinadler: groß wie Enteneier, oval, weißlich, wenig hellbraune Sprengel,

1.37 Nennen der Adlerarten, die in Bayern sowie in Deutschland vorkommen

Antwort: Steinadler, Seeadler, Fischadler, Schreiadler

1.38 Brutbiologie der Adlerarten

Antwort: - Geschlechtsreife mit 2-4 Jahren, Brutreife mit etwa mit 3-5 Jahren
 - Reviertreu, meist sehr territorial,
 - Lebenslange Partnerschaft,
 - Horstbauer, Nebenhorste, begrünt, meist in Nischen von Felswänden,
 - Hauptbrutgeschäft durch Weib - Männchen ernährt
 - meist 2 Eier – Kainismus, nur ein Küken überlebt,
 - lange Nestlingsdauer,
 - (??)

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

1.39 Gewölle erkennen

Antwort: **Greifvögel:** rundlichovale Speiballen aus unverdaulichen Beuteresten wie Haare, Federn, Zähne, Krallen, usw. **OHNE Knochen**,
Eulen: rundlichovale Speiballen aus unverdaulichen Beuteresten wie Haare, Federn, Zähne, Krallen, **mit Knochen**,

1.40 Fotos von Greifvögeln im Flug erkennen (Bartgeier; Rotmilan....)

Antwort: (googeln – lernen)

1.41 Vorkommen und Brutbiologie des Bartgeiers

Antwort: **Vorkommen:** in den Hochgebirgsregionen von Nordwest-Afrika, Spanien, Alpenraum, Balkan über Zentralasien bis Mongolei und China,
Brutbiologie: territoriale Standvögel,
 Trios mit meist 2 Terzel und 1 x Weib kommen vor,
 meist lebenslange Partnerschaft,
 Brutreife mit 6-8 Jahren,
 Balz ab Ende November,
 Horstbau mit Ästen meist in gut wettergeschützten Halbhöhlen in Felswänden,
 Horstauskleidung mit Fellresten und Wolle,
 Horstnutzung über Jahre, auch die Wechselhorste,
 Legebeginn im Januar, 2 Eier wovon eines immer schwerer, größer und stärker pigmentiert ist,
 Legeabstand 4-6 Tage,
 Brutbeginn ab 1. Ei,
 Brutdauer 52 – 56 Tage,
 Kainismus, nur ein Junges überlebt,
 Nestlingsdauer etwa 123 Tage,
 Erstflug Ende Mai bis Ende Juli,
 selbstständig ab September,

1.42 Welche Federn sind das? Wo sitzen diese Federn?

(waren jeweils eine Schwung- und eine Stoßpenne von Steinadler, Habicht, Wanderfalke und den verschiedenen Bussarden)

Antwort: (featherbase – lernen)

1.43 Präparate abgefragt: Baumfalke, Rohrweihe, Raufußbussard, Milane

Antwort: (Präparate lernen)

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

1.44 Ich musste zeigen welche der Präparate Zugvögel sind

Antwort: Zugvögel sind: Rauhußbussard, Wespenbussard, Schreiadler, Fischadler, Schlangenadler, Rotmilan (?), Schwarzmilan, Rohrweihe, Wiesenweihe, Gerfalke (?), Sakerfalke, Baumfalke, Merlin,

1.45 Beute und Brutgebiete der Präparate nennen

Antwort: (lernen)

1.46 Ich habe zwei Bilder von männlichen Rohrweihen vorgelegt bekommen: Welche Weihen sind das? Wo brüten diese Weihen? Kann es stimmen, wenn ich sage, ich habe gestern eine Weihe gesehen?

Antwort: Rohrweihe: Bestimmung:
Rücken und Schultern dunkelbraun, Flügel grau und an der Spitze schwarz, der lange Schwanz ist hellgrau, Kopf und Hals sind hell rostgelb mit dunkelbrauner Strichelung, Bauch und Schenkel rostbraun.
Wo brüten sie:
In offenen verlandeten See- und Teichlandschaften mit niedriger Vegetation auf dem Boden im dichten hohen Bewuchs, Gras, Schilf mittlerweile auch Rapps und Getreide,
Vorkommen:
Von Nordwestafrika über die Mittelmeerländer und Deutschland bis Südschweden, Finnland quer durch Asien bis Japan; in tiefen Lagen.
Bei uns nur während der Brutzeit im Sommer von April bis August / September zu sehen und im Winter im Mittelmeerraum oder Westafrika und südlich der Sahara, Ja, das kann im Januar stimmen – eine Kornweihe !

1.47 Ich habe einen Zeitungsartikel mit einem Sperberbild bekommen, darunter stand aber „Turmfalke“, Frage: Was stimmt bei dem Bild nicht?

Antwort: (Erkennungsmerkmale des Sperbers, ...)

1.48 Welche heimischen Geier kennen sie?

Antwort: Mönchsgeier, Gänsegeier, Bartgeier, Schmutzgeier

1.49 Welche heimischen Greifvögel sind Nahrungsspezialisten?

Antwort: Fischadler, Wespenbussard (weitere ??)

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

1.50 Fotos Erkennen: juv. Wiesenweihe / adulte Wiesenweihe anhand eines isolierten Kopf-Portraits

Antwort: **Jungvogel:** Kopf ist braun bis rostrot und hat eine weißliche Augenumrandung, dunkle schwarzbraune Augen, kleiner Schnabel, Gesichtsschleier,
Altvogel Weib: Kopf ist braun bis dunkelbraun und hat eine weißliche Augenumrandung, gelbe Augen, kleiner Schnabel, Gesichtsschleier,
Altvogel Terzel: Kopf ist einfarbig aschgrau, leuchtend gelbe Augen, kleiner Schnabel, Gesichtsschleier, (?)

1.51 Heimische Weihenarten und deren Differenzierung, welche Weihenart kommt im Jan. bei uns vor?

Antwort: **Rohrweihe:** **Terzel:** Rücken und Schultern dunkelbraun, Flügel grau und an der Spitze schwarz, der lange Schwanz ist hellgrau, Kopf und Hals sind hell rostgelb mit dunkelbrauner Strichelung, Bauch und Schenkel rostbraun. Ca. 540 g
Weib: fast einfarbig dunkelbraun nur Kehle, Scheitel und Flügelbug gelbweißlich bis rahmfarben gefärbt, ca. 740 g
Wiesenweihe: **Terzel:** Kopf, Rücken und Brust aschgrau, Unterseite weißlich mit rostbraunen Längsstreifen, schwarze Flügelspitzen, auf den Armschwingen 2 schwarze Querbänder oben und unten, reinweiße Oberschwanzdecken, Anzahl der Finger 3, ca. 260 g
Weib: Kopf ist braun bis dunkelbraun und hat eine weißliche Augenumrandung, gelbe Augen, Gesichtsschleier, ca. 370 g
Kornweihe: nur Wintergast in Deutschland kein Brutvogel (heimisch?)
Vorkommen im Januar: nur die Kornweihe

1.52 Rotmilan (Vorkommen, Brutverhalten)

Antwort: **Vorkommen:** Fast ausschließlich in Mitteleuropa mit 20.000 Brutpaaren und etwa 60% davon, also 12.000 Brutpaaren in Deutschland.
Brutverhalten: Fortpflanzungsfähig im Alter von 2-3 Jahren, Horstbau oder Horstbesetzung im Februar bis Anfang März, Balz mit spektakulären Schleifensturzflügen, Horst meist auf hohen Bäumen am Rand lichter Baumbestände, Horst mit Papier, Plastikfetzen, Lumpen, Fellstücken ausgekleidet,

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Legebeginn:	Ende März / Anfang April,
Gelegegröße:	meistens 2-3 Eier,
Legeabstand:	2–4 Tage,
Bebrütungsbeginn:	nach dem 1. Ei
Brutdauer:	32–33 Tage,
hauptsächlich brütet das	Weib, der Terzel ernährt Weib und Junge,
Nestlingsdauer:	48-45 Tage, danach noch 3 Wochen Betreuung durch die Eltern,

1.53 Heimische Adlerarten (welche fest/ welche Zugvogel), Vorkommen, Brutverhalten

Antwort: **Steinadler:** (Standvogel) von Westeuropa über Nordafrika bis Kamtschatka und Japan, Alaska, Kanada über den Westen der USA bis Mexiko,
Geschlechtsreife im Alter von 4-5 Jahren,
Balzbeginn im Januar,
lebenslange Partnerschaft, Horstbauer, revier- und horsttreu,
Horst in Nischen von Felswänden oder auf hohen Bäumen
Legebeginn: meist Ende März,
Gelegegröße: 1-3 meistens 2 Eier,
Legeabstand: 2-5 Tage,
Bebrütungsbeginn: ab dem 1. Ei
Brutdauer: 42-44 Tage,
Kainismus,
Nestlingsdauer: 65-85 Tage,

Seeadler: (Standvogel) Skandinavien, Mittel- und Südosteuropa über Russland bis Nordost-China,
Geschlechtsreife im Alter von 3-4 Jahren,
Herbstbalz Oktober/November, Balz Dezember bis Februar,
lebenslange Partnerschaft, Horstbauer,
Horst in Nischen von Felswänden oder auf hohen Bäumen
Legebeginn: Ende Februar bis Ende März,
Gelegegröße: 1-3 meistens 2 Eier,
Legeabstand: 2-4 Tage,
Bebrütungsbeginn: ab dem 1. Ei
Brutdauer: 37-38 Tage,
Nestlingsdauer: 75-90 Tage,

Fischadler: (Zugvogel) auf allen Kontinenten außer in der Arktis,
bei uns an den Seen in der norddeutschen Tiefebene,
Brandenburg, Mecklenburg und Polen – im Winter in
Westafrika südlich der Sahara bis zum Äquator,
Geschlechtsreife im Alter von 3 Jahren,
wechselnde Partnerschaften, selten auch Trios möglich,
Horstbauer, Horst auf hohen Bäumen, in Felswänden
neuerdings auch Strommasten und ähnlichen Gerüsten,

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Legebeginn:	Anfang bis Mitte April,
Gelegegröße:	2-3 Eier,
Legeabstand:	1-3 Tage,
Bebrütungsbeginn:	ab dem 1. oder 2. Ei
Brutdauer:	38-41 Tage,
Nestlingsdauer:	50-54 Tage,
Bettelflug:	bis zu 8 Wochen, (Terminus ?)

Schreiadler:(Zugvogel) im östlichen Europa von Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg über Ungarn, Slowakei, Balkan, Türkei, Polen Ukraine, die baltischen Staaten, Weißrussland und Russland bis zum Kaukasus.

Geschlechtsreife im Alter von 4-5 Jahren,	
Balzbeginn Anfang April,	
lebenslange Partnerschaft, sehr reviertreu, Horstbauer,	
Horst auf hohen Nadel- oder Laubbäumen,	
Legebeginn:	Ende April Anfang Mai,
Gelegegröße:	1-3 meistens 2 Eier,
Legeabstand:	3-4 Tage,
Bebrütungsbeginn:	ab dem 1. Ei
Brutdauer:	37-41 Tage,
Kainismus,	
Nestlingsdauer:	58 Tage,
Bettelflug:	3-4 Wochen, (Terminus ?)

1.54 Erklärung Kainismus (was es ist und bei welchen Arten)

Antwort: das kleiner und schwächere, meist später geborene Küken wird vom stärkeren Erstgeborenen unterdrückt und von der Nahrung abgedrängt bis es stirbt,
Kainismus kommt vor bei: **Steinadler, Schreiadler, Bartgeier,**

1.55 Geier (wo bei uns vorkommen, woher kommend , Ansiedlungsprojekte, Häufigkeiten)

Antwort: **Arten:** Mönchsgeier, Gänsegeier, Bartgeier, Schmutzgeier,
Vorkommen: Spanien - Pyrenäen, Südfrankreich, Alpen, Korsika, Kreta, Türkei, in offenen zivilisationsfreien Fels- und Gebirgslandschaften
kommen von: (???)

Ansiedlungsprojekte:

Mönchsgeier: derzeit laufen Wiederansiedlungs-Projekte auf dem Balkan und im Süden Frankreichs, 2022: in EU ca. 2800 Brutpaare

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Gänsegeier: Wiederansiedlungsprojekte in Frankreich, Selbstständiger Einflug von Gänsegeiern aus Spanien und Frankreich nach Italien, Österreich, Schweiz und Deutschland,

Bartgeier: junge Bartgeier aus Andalusien/Spanien werden im Nationalpark Berchtesgaden im Alter von 100 Tagen ausgewildert, auch in Frankreich, Schweiz und Österreich gibt es derartige Wiederansiedlungsprojekte,

Schmutzgeier: Nachzuchtstationen in Haringsee/ Österreich und im Zoo in Wien sowie in der Station Semproniano/Italien für Wiederansiedlungsprojekte,

Bestände in EU:	Mönchsgeier	2800 Brutpaare
	Gänsegeier	2400 Brutpaare
	Bartgeier	320 Brutpaare
	Schmutzgeier	3000 Brutpaare (???)

1.56 Besonderheiten Bartgeier und Schmutzgeier bei Nahrungserwerb Erläuterung der roten Brustfärbung (Eisenoxydhaltiger Schlamm)

Antwort: **Bartgeier:** Knochenmühlen
Suhlen in eisenoxidhaltigen Suhlen zum rostroten Einfärben des weißen Gefieders auf der Unterseite vermutlich als Status-Signal,

Schmutzgeier: verwendet Steine zum Öffnen von Straußeneiern, Suhlen heimlich in gelben Suhlen zum Einfärben des weißen Gefieders auf Hals und Unterseite vermutlich auch als Status-Signal,

1.57 Eleonorenfalken (Vorkommen, Besonderheiten Brutverhalten / Nahrungserwerb)

Antwort: **Vorkommen:** auf Inseln und an Felsküsten rund um das Mittelmeer mit Schwerpunkt auf den griechischen Inseln und Kreta,

Besonderheiten Brutverhalten: Koloniebrüter mit bis 350 Paaren, später Legebeginn richtet sich nach dem Singvogelzug von Europa nach Afrika, Zugvogel mit Winterquartier auf Madagaskar,

Nahrungserwerb: gemeinsame kooperative Jagdflüge auf wandernde Kleinvögel von Mitte August bis Mitte Oktober (Aufzuchtzeitraum) und Insekten, Käfer, Libellen, Schmetterlinge vom November bis Juli.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

1.58 Erkennen von Steinadler, Wespenbussard, Seeadler, Habichtfedern

Antwort: (featherbase – lernen)

1.59 Gewölle von Eule, Mäusebussard und Habicht unterscheiden

Antwort: **Eulen:** rundlichovale Speiballen aus unverdaulichen Beuteresten wie Haare, Federn, Zähne, Krallen, **mit Knochen**,

Mäusebussard: rundlichovale Speiballen aus unverdaulichen Beuteresten wie Haare, Federn, Zähne, Krallen, usw. **OHNE Knochen**,

Habicht: rundlichovale Speiballen aus unverdaulichen Beuteresten wie Haare, Federn, Zähne, Krallen, usw. **OHNE Knochen**,

1.60 Eier von Uhu, Habicht erkennen und Tatsache, dass Uhu auch Ei in Habichtnest legt

Antwort: **Uhu:** fast kugelig rund, überwiegend weiß oder cremefarben mit sehr wenig kleinen braunen Sprenkeln, Eulen sind keine Horstbauer sondern Horstbezieher und verwenden schon mal alte Habichtshorste,

Habicht: oval mit einem runden und einem spitzen Pol, in Form und Größe dem Hühnerei ähnlich, Farbe weißlich bis cremefarben mit einigen kleinen braunen Sprenkeln (????)

1.61 Woran man erkennt, wo Habicht seinen Horst hat?

Antwort: Mauserfedern, Gewölle, Rupfungen, Schmelz und an den Rufen

1.62 Federn erkennen und nach Habichtartigen zuordnen

Heimische Arten von Bussarden
Heimische Falken + Wintergäste
Alle Falken in Europa

Antwort: (featherbase – lernen)

1.63 Eleonorenfalke Brutverhalten, Jagdweise, Winter und Sommerquartier

Antwort: **Brutverhalten:** Koloniebrüter mit bis 350 Paaren, später Legebeginn richtet sich nach dem Singvogelzug von Europa nach Afrika, Brutreife mit 2-3 Jahren, in schattigen Löchern und Nischen in Steilküsten, Legebeginn: Ende Juli / Anfang August, Gelegegröße: 2-3 Eier

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Legeabstand: 2-3 Tage
 Bebrütungsbeginn: mit dem 1. Ei
 Brutdauer: 28-30 Tage
 Nestlingsdauer: 37-44 Tage
 Bettelflugdauer: 3 Wochen
Jagdweise: gemeinsame kooperative Jagdflüge auf wandernde Kleinvögel von Mitte August bis Mitte Oktober (Aufzuchtzeitraum) und Insekten, Käfer, Libellen, Schmetterlinge vom November bis Juli.
Winter-Sommer: Zugvogel,
Sommer: auf Inseln und an Felsküsten rund um das Mittelmeer mit Schwerpunkt auf den griechischen Inseln und Kreta,
Winter: auf Madagaskar,

1.64 Weihenarten und -vorkommen bei uns

Antwort: **Rohrweihe:** **Terzel:** Rücken und Schultern dunkelbraun, Flügel grau und an der Spitze schwarz, der lange Schwanz ist hellgrau, Kopf und Hals sind hell rostgelb mit dunkelbrauner Strichelung, Bauch und Schenkel rostbraun. Ca. 540 g
Weib: fast einfarbig dunkelbraun nur Kehle, Scheitel und Flügelbug gelbweißlich bis rahmfarben gefärbt, ca. 740 g
Wiesenweihe: **Terzel:** Kopf, Rücken und Brust aschgrau, Unterseite weißlich mit rostbraunen Längsstreifen, schwarze Flügelspitzen, auf den Armschwingen 2 schwarze Querbänder oben und unten, reinweiße Oberschwanzdecken, Anzahl der Finger 3, ca. 260 g
Weib: Kopf ist braun bis dunkelbraun und hat eine weißliche Augenumrandung, gelbe Augen, Gesichtsschleier, ca. 370 g
Kornweihe: nur Wintergast in Deutschland kein Brutvogel (heimisch?)
Vorkommen im Januar: nur die Kornweihe

1.65 Welche Weihe finden sie jetzt im Januar bei uns

Antwort: die Kornweihe

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

1.66 Rot- und Schwarzmilan - Unterschied der Zugrouten und warum zieht der Schwarzmilan bis Afrika?

*Antwort: **Rotmilan:** meist Stand- oder Strichvogel, wenn Zugvogel dann Westzieher nach Spanien oder über Gibraltar nach Marokko,*

***Schwarzmilan:** Verbreitungsgebiet liegt schwerpunktmäßig in Osteuropa und Asien bis China und die Winterquartiere überwiegend in Ostafrika daher nutzen die Mehrzahl der Schwarzmilane die Zugroute östlich des Schwarzen Meeres über Georgien und über die Arabische Halbinsel nach Ostafrika, der Schwarzmilan folgt den Regenzone in Afrika um schwärmende Termiten zu fangen,*

1.67 Woran erkennen Sie, dass es sich um eine Weihe handelt?

Antwort: mittelgroße Greifvögel, schlanker Körper, lange breite Flügel im Flug V-förmig nach oben gehalten, langer Stoß, lange Ständer, eher kleiner Schnabel, Gesichtsschleier, gaukelnder Suchflug in geringer Höhe, auffällige luftakrobatische Schauflüge zur Balz, Bodenbrüter.

1.68 Woran erkennen Sie, dass es sich um eine weibliche, adulte Rohrweihe handelt?

Antwort: fast einfarbig dunkelbraun nur der Scheitel, die Kehle und der Flügelbug sind gelblichweiß,

1.69 Wie sieht die männliche Rohrweihe aus?

Antwort: Rücken und Schultern dunkelbraun, Flügel sind grau und an der Spitze schwarz, der lange Stoß ist hellgrau, Kopf und Hals sind hell rostgelb mit dunkler Strichelung, Bauch und Schenkel sind rostbraun.

1.70 Welche Adler sind bei uns heimisch?

Antwort: Steinadler, Seeadler, Fischadler, Schreiadler,

1.71 Wie viele Schreiadler schätzen Sie, gibt es bei uns?

Antwort: sehr wenige, etwa 100 Brutpaare

1.72 Wo finden Sie bei uns Seeadler?

Antwort: fast im ganzen Bundesgebiet, die meisten jedoch in den nordöstlichen Bundesländern

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

1.73 Wo finden Sie bei uns Fischadler?

Antwort: fast im ganzen Bundesgebiet die meisten jedoch an den Seen in den nordöstlichen Bundesländern

1.74 Welche Zugvögel kennen Sie?

Antwort: Fischadler, Schreiadler, Zwergadler, Rauhfußbussard, Wespenbussard, Schwarzmilan, Rohrweihe, Wiesenweihe, Baumfalke, Merlin,

1.75 Nennen Sie Durchzügler und Wintergäste!

Antwort: Rauhfußbussard, Kornweihe, Merlin, (???)

1.76 Bestimmen Sie die vorliegenden Federn (6 Klarsichthüllen mit jeweils mehreren zusammengehörenden Federn werden vorgelegt)

Antwort: („Die Greifvögel“ von Mebs – üben!)

1.77 Wo brütet der Habicht?

Antwort: im Altbaumbestand etwa 50m vom Waldrand weg an einer Zufahrt oder baumfreien Schneise, auf einem hohen alten Baum am Stamm oder in einer dicken Stammgabelung.

1.78 Woher wissen Sie, dass sie einen Habicht im Revier haben?

Antwort: typische wandernde Habicht-Rupfungen, Mauserfedern, Rufe, (???)

1.79 Wo brütet der Sperber?

Antwort: in lichten bis dichten, mittelhohen Baumbeständen, auf Nadelbäume in Stammnähe auf einer Höhe von 6-8m, (???)

1.80 Woran erkennen Sie ein Sperbernest?

Antwort: es ist nicht begrünt

1.81 Fotos vom Schelladler/Schreiadler werden vorgelegt - erkennen und beschreiben, welche Merkmale herangezogen werden.

*Antwort: **Schelladler:** Altvogel einheitlich sehr dunkelbraun gefärbt, viel dunkler als der Schreiadler, Iris dunkelbraun, größerer Schnabel als beim Schreiadler, Junge Schelladler haben eine schwarzbraune Grundfärbung mit auffallenden hellen großen Tropfenflecken auf den Armdecken in 2-3 Reihen,*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Schreiadler: *Altvögel überwiegend erdbraun, am Kopf und Hals sowie auf den Flügel- und Schulterdecken deutlich heller, mit weißem Carpalfleck auf beiden Flügeln, häufig mit hell bis weiß gefärbten Oberschwanzdeckenbereich, insgesamt deutlich heller als der Schelladler, Iris bernsteingelb, kleinerer Schnabel als beim Schelladler, langbeinig, Junge Schreiadler sind einheitlich dunkelbraun mit hellem Flügelhinterrand und hellen Spitzen der großen Flügeldeckfedern, rostgelber Nackenfleck,*

----- 2024 -----

1.82 Wie zählt man in Deutschland im Winter die anwesenden Kornweihen?

Antwort: Zählung an den Sammelschlafplätzen, die sind im hohen Bewuchs auf dem Boden. Abends fallen die Kornweihen aus dem hohen Suchflug steil nach unten in die Sammelschlafplätze ein. (wie man da genau zählt – mit Drohne oder so blieb unbeantwortet)

1.83 Von welchem Greifvogel ist diese Feder?

Antwort: Stoßpenne vom Habicht! Weib oder Terzel (Feder war ziemlich groß)? Also Habicht-Weib.

1.84 Liegen hier auf dem Tisch (insg. ca. 40 Federn) weitere Habicht Federn?

Antwort: ja, eine sehr kleine Stoßpenne vom juvenilen Terzel. ((Hinweis Nb: wenn man die Federn von ihrer Unterseite ansieht ist bei allen Federn der Kiel durchgehend weiß, NUR beim Habicht und beim Sperber gehen die dunklen Querbänder auch durch den Kiel !))

1.85 Reinweiße Feder mit wenigen dunklen Sprenkeln – von welchem Greifvogel?

Antwort: Gerfalke

1.86 Feder mit dicker Endbinde und zwei schalen dunklen Querbänden darüber, sonst ziemlich weiß - von welchem Greifvogel ist diese Feder?

Antwort: Wespenbussard

1.87 Präparat vom Wanderfalken mit rötlicher Brust. Welcher Greifvogel und Alter?

Antwort: Wanderfalke, alt

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

1.88 Was ist die Lieblingsbeute des Wanderfalken?

Antwort: Taube (laut Mebs: mit 32% das häufigste Beutetier).

1.89 Welche Förderprogramme für Weihen in Deutschland kennen Sie und wie heißen sie genau?

Antwort: ???

1.90 Bei welchen europäischen Greifvögel tritt Kainismus auf?

Antwort: Steinadler, Schreiadler, Schelladler, (echte Adler

1.91 Warum zieht der Schwarzmilan nach Afrika?

Antwort: Wegen dem warmen Klima und folgt den feuchten Regengebieten wegen der Nahrung / Fische.

1.92 Federn vom Wanderfalken Schwinge und Stoß erkennen.

Antwort:

1.93 Federn vom Turmfalken Schwinge und Stoß erkennen.

Antwort:

1.94 Unterschied an den Stoßpennen vom Turmfalken-Weib und -Terzel.

Antwort:

1.95 Handschwinge vom Rotmilan erkennen.

Antwort:

1.96 Warum hat der Fischadler keinen Kropf?

Antwort: ???

1.97 Wo brüten die Weihen in Bayern?

Antwort:

1.98 Was dezimiert der Steinadler?

Antwort:

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

1.99 Woran liegt es, dass alle paar Jahre beim Steinadler wenig oder keine Küken schlüpfen?

Antwort:

1.100 Welche Schutzprogramme gibt es für den Schreiadler und wie heißen diese?

Antwort:

2. Haltung und Pflege:

2.1 Haubenformen erkennen

Antwort: **Indische Form:** auch asiatische oder kirgisische Form genannt,
einteilig mit offenem Verschluss,
mit breit ausgeschnittenen Schnabelwinkel,
besonders geeignet für Habicht und Harris Hawk,
Arabische Form: einteilig, mit teilweise verdecktem Verschluss,
Holländische Form: oder auch Stockhaube genannt,
besteht aus 3 zusammengenähten Teilen,
mit offenem Verschluss,

2.2 Telemetrie erklären

→ aus was besteht sie und welche Montagearten gibt es

Antwort: Eine Telemetrieanlage, Kosten von 700 € aufwärts, besteht aus einem Sender, einem Empfänger und einer Richtantenne. Der Sender strahlt Funkwellen aus, die vom Empfangsgerät über die Richtantenne in ein akustisches und optisches Signal umgewandelt werden. Anhand der Intensität des empfangenen Signals kann die Richtung bestimmt werden, in der sich der Beizvogel verfliegen hat. Die Entfernung lässt sich nicht genau bestimmen, mit einer gewissen Übung kann man die Entfernung aber grob abschätzen. Die Reichweite der Telemetrie beträgt 5 km, bei teureren Anlagen auch erheblich mehr. Montagearten:

Die **Ständerbefestigung** ist eine häufige Befestigungsart. Der Sender wird über dem Geschüh befestigt, was der Greif wie das Anlegen des Geschühs gewöhnt ist. Es ist eine sichere Montage, die allerdings, wenn der Beizvogel mit der Beute auf dem Boden steht, das schwächste Signal im Vergleich zu anderen Montagen liefert.

Bei der **Stoßmontage** wird mit einer kleinen Metallmanschette der Sender an einer der Deckpennen befestigt. Dadurch bleiben die Hände des Beizvogels frei und das übermittelte Signal ist besser zu empfangen, wenn der Beizvogel auf dem Boden steht. Größter Nachteil ist, dass die Stoßfeder durch den Sender herausgezogen werden kann, z.B. beim Kampf des Beizvogels mit wehrhaften Wild wie Krähen. - 13-

Bei der **Rucksackmontage** wird der Sender mit einer Klammer versehen, auf dem Rücken des Beizvogels wird ein schmales Metallplättchen zwischen den Schulterblättern von zwei Teflonbändern gehalten, die vom Rücken kommend kreuzförmig über die Brust und unter den Schwingen hindurch zurück zum Metallplättchen laufen.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Von Vorteil ist, die Ständer sind frei von unnötigen Ballast und der Sender ist dem Vogel bei keiner seiner Aktivitäten im Wege und durch die höhere Position als bei der Ständermontage sind die Sendeeigenschaften besser. Die Montage des Senders ist naturgemäß schwieriger und muss perfekt sitzen.

2.3 Wie transportiert man einen Falken in sein Revier im Auto?

→ Transportbox

Antwort: Ein Falke kann verhaubt auf der niederen Reck, dem Rücksitz, im Kofferraum, auf der Faust (wenn man selbst nicht fährt!!) in einer Cadge oder einer Transportbox transportiert werden. Bei der Transportbox ist wichtig: Mit griffiger Sitzstange, ausreichend Belüftungslöcher und die Ausrichtung der Sitzstange sollte längs in Fahrtrichtung angeordnet sein, dass ein Hin und Her-fallen des Vogels beim Bremsen und ein damit einhergehendes Flügelschlagen vermieden wird. Der Vogel schlägt sonst seine Schwingenfedern ab. Nervösen Vögeln kann man vor dem Transport das Gefieder besprühen, so ist der Vogel während der Fahrt mit dem Trocknen des Gefieders beschäftigt. Zusätzlich kann zum Schutz des Stoßes eine Manschette angebracht werden. Alle weiteren rechtlichen Bedingungen an den Transport und die Transportbox finden sich in der Transportverordnung.

2.4 Wie ist eine Transportbox aufgebaut?

Antwort: S.O.

2.5 Was braucht man zum Aufschnüren eines BV?

Antwort: der/die/das Geschüh, die Bell mit Bellriemen, Drahen und eine Lang- und Kurzfessel, (Adresstafel und Haube) – Gesamtbezeichnung dieser Einzelteile ist Geschirr

2.6 Wie legt man Geschüh am Präparat an?

→ Ring hochschieben

Antwort: Geschüh wird immer als unterstes am Ständer des Vogels befestigt, wichtig ist weiches Leder und eine passende Größe fehlt noch Info?

2.7 Gebe ich meinen BV geschossene Krähen von einem Jagdkollegen?

→ Warum nicht?

Antwort: dem BV sollte nur die beste Atzung gefüttert werden - Atzungshygiene, wichtig auch ist, dass die Krähe nicht mit Bleischrot geschossen wurde, sonst kann es zu Entzündungen und Vergiftungen im Magen-/Darmtrakt kommen. Also nein, keine Krähen vom Jagdkollegen verfüttern.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

2.8 Wie schaut gesunder Schmelz aus?

*Antwort: weißlicher Harnanteil und dunkler Kotanteil.
Wenn sich der weißliche Teil verändert, lässt das auf eine Erkrankung im Harnapparat schließen (Niere bis Harnleiter) und wenn sich der dunkle Teil verändert, lässt sich auf eine Erkrankung im Verdauungstrakt schließen (Schnabel bis Kloake)*

2.9 Was konnte sein, wenn der Schmelz bräunlich ist?

Antwort: fehlt noch Info

2.10 Wie kann ich meinen BV Tauben verfüttern?

Auf was ist vorher zu achten? → Gelber Knopf

Antwort: Gesundheit der Taube überprüfen und kontrollieren, dass sie keine Kropfentzündung hat. Taube darf keinem Greifvogel gefüttert werden, der zu tief ist, weil Taube sehr nahrhaft und von tiefen Greifvögeln nicht verdaut werden kann. Am besten Taube vorher bei mind. -18° Celsius einfrieren, damit potentielle Keime abgetötet sind. Bei Verfütterung der Taube ohne besondere Vorkehrungen, kann es sein, dass der Vogel Trichomonaden bekommt, sprich Parasiten, die man an gelben Ablagerungen im Rachen und unangenehmen Geruch erkennen kann.

2.11 Welche Langfessel ist besser?

Aus Leder oder Nylon und warum?

Antwort: das ist Geschmacksache, die Lederfessel muss regelmäßig gepflegt werden. Leichter zu Handhaben und um den Falknerknoten zu machen ist oftmals die Nylonschnur. Adlerleute verwenden oft bevorzugt Lederlangfesseln, Fesselmaterial sollte auch zur Größe und zum Gewicht des Vogels passen.

2.12 Wie binde ich BV am hohen Reck an?

Antwort: Man braucht als Verlängerung der Langfessel die Kurzfessel, wenn man den Habicht anbindet, um ihm mehr Bewegungsfreiheit zu geben. Dann bindet man dem Vogel mit dem Reckknoten an. Sinnvoll während der Beizsaison, um Vogel locke zu machen, allerdings immer mit Bell anbinden und Vogel immer im Blick haben. Wichtig ist auch, dass der Vogel vorher das Aufschwingen beherrscht.

2.13 Welchen Spielraum hat der BV auf der hohen Reck?

→ Geschühlänge

Antwort: Geschüh plus Langfessel plus Kurzfessel plus Drahlenlänge

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

2.14 Welche Drahle benutze ich für den Habicht?

Antwort: die Spitz- oder Langdrahle, um den langen Stoß zu schonen.

2.15 Welche mobilen Einrichtungen gibt es für den BV?

→ Sprengel, Block

Antwort: Sprengel, Block, Hohes Reck

2.16 Welche stationären Einrichtungen?

→ Zuchtvoliere, Reckkammer, Mauserkammer, Voliere, Flugdrahtanlage

Antwort: Zuchtvoliere, Reckkammer, Mauserkammer, Voliere, Flugdrahtanlage mit Spitzhütte

2.17 Transportbox beschreiben

in welche Richtung steht der Vogel in der Box > Fahrtrichtung

Antwort: Seitlich zur Fahrtrichtung, um Flügelschlagen bei Bremsvorgängen zu unterbinden und damit Abschlagen der Schwingen zu vermeiden

2.18 Geschüharten - beschreiben Sie das „Ösen“geschüh

Antwort: Auch Aylmeri-Geschüh genannt. Besteht aus Manschetten, die fest an den Ständern des Vogel angebracht werden und mit Ösen verschlossen sind. Durch die Ösen werden dann die Geschühriemen gefädelt, die auf der einen Seite einen Knoten haben, der nicht durch die Ösen passt und auf der anderen Seite einen Schlitz hat, in dem die Langfessel eingefädelt werden kann.

2.19 Habicht in freier Folge. welches Geschüh würden Sie bevorzugen?

-> „Ösen“ geschüh erlaubt Wechsel des Geschühriemens - in jedem Fall Geschühriemen ohne Schlitz nehmen da sich der andere (mit Schlitz) im Baum verhängen kann

Antwort: Das Ösengeschüh, da ich die Geschühriemen entfernen kann und den Vogel nur mit den Manschetten, der Bell und dem Adresstäfelchen fliegen lasse. Wichtig damit sich der Vogel nicht mit den Geschühriemen im Baum beim Abstellen verhängen kann.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

2.20 Telemetrie: Vorlage von 3 Transpondern

+ welcher ist für die Ständermontage geeignet?

-> es war (nur) einer mit Riemen dabei

+ welcher davon ist für die Rucksackmontage gedacht?

Antwort:

Ständerbefestigung: ist eine häufige Befestigungsart. Der Sender wird über dem Geschüh befestigt, was der Greif wie das Anlegen des Geschühs gewöhnt ist. Es ist eine sichere Montage, die allerdings, wenn der Beizvogel mit der Beute auf dem Boden steht, das schwächste Signal im Vergleich zu anderen Montagen liefert.

Stoßmontage: wird mit einer kleinen Metallmanschette der Sender an einer der Deckpennen befestigt. Dadurch bleiben die Hände des Beizvogels frei und das übermittelte Signal ist besser zu empfangen, wenn der Beizvogel auf dem Boden steht. Größter Nachteil ist, dass die Stoßfeder durch den Sender herausgezogen werden kann, z.B. beim Kampf des Beizvogels mit wehrhaften Wild wie Krähen. - 13-

Rucksackmontage: wird der Sender mit einer Klammer versehen, auf dem Rücken des Beizvogels wird ein schmales Metallplättchen zwischen den Schulterblättern von zwei Teflonbändern gehalten, die vom Rücken kommend kreuzförmig über die Brust und unter den Schwingen hindurch zurück zum Metallplättchen laufen. Von Vorteil ist, die Ständer sind frei von unnötigen Ballast und der Sender ist dem Vogel bei keiner seiner Aktivitäten im Wege und durch die höhere Position als bei der Ständermontage sind die Sendeeigenschaften besser. Die Montage des Senders ist naturgemäß schwieriger und muss perfekt sitzen.

2.21 Welche Antennenarten gibt es für den Empfänger und wozu ist welche Antennenart da?

-> Peilung des Vogels bzw. reiner Empfang der (GPS) Daten

Antwort: Es gibt die Winkelsuche (Bildung 50 km Suchkreis und 90° Suchwinkel, Flugrichtung muss hierfür bekannt sein) und die Spiralsuche (Flugrichtung ist unbekannt, Kreisfläche 50km, Einfügen von Peilpunkten im Abstand von 5km und Bögen maximal im Abstand von 10 km) **hier fehlen Infos?**

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

2.22 Erkennen und Benennen der 3 Haubenformen

Antwort: **Indische Form:** auch asiatische oder kirgisische Form genannt,
einteilig mit offenem Verschluss,
mit breit ausgeschnittenen Schnabelwinkel,
besonders geeignet für Habicht und Harris Hawk,
Arabische Form: einteilig, mit teilweise verdecktem Verschluss,
Holländische Form: oder auch Stockhaube genannt,
besteht aus 3 zusammengefügten Teilen,
mit offenem Verschluss,

2.23 Atzung für Nestling: Rachitis - wie erkennen und wie vermeiden

-> Knochenbeigabe - ab wann gibt man Gewölle bildende Stoffe?

Antwort: Atzung muss artgemäß, abwechslungsreich und nahrhaft sein, sehr gut eignet sich fein faseriges Fleisch, wie Rinderherz, Eintagsküken, Kaninchen, Wachtel, Taube... Wichtig in Bezug auf Rachitis ist, den Jungen ausreichend Kalk zuzufüttern und sie bei Tageslicht aufzuziehen. Rachitis macht sich durch Knochenweiche erkennbar und dies sieht man z.B. an verkrümmten Ständern und Händen bzw. Füßen.
Gewölle bildende Stoffe erst bei letzter Atzung des Tages dazu füttern.

2.24 Was verstehen sie unter einem „sauren Kropf“?

Antwort: Candidiasis, ein Pilzbefall auf Schleimhäuten, kommt von übermäßigem Antibiotikagebrauch, Stress, jungen und alten Tieren.

2.25 Was nehme ich beim Abholen meines Jungvogels zum Züchter direkt mit?

Antwort: Das Geschüh, damit ich den Vogel mit dem Züchter zusammen aufschirren kann. **????Das Einzige, was mir einfällt dazu...**

2.26 Wie transportiere ich den Jungvogel nach Hause?

Antwort: In einer geeigneten Transportbox gemäß der Transportverordnung.

2.27 Was mache ich zuhause/ erste Nacht?

Antwort:

2.28 Was mache ich am nächsten Tag?

Antwort:

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

2.29 Wird er sofort am ersten Tag kröpfen?

Antwort:

2.30 Wie gewinne ich das Vertrauen meines Vogels/ mache ich ihn mit mir vertraut?

Antwort: Nach dem Aufschirren stelle ich ihn an einen Block bzw. Sprenkel, damit er sich an die Anbindehaltung gewöhnen kann. Danach wird der Vogel etwa zwei Wochen viele Stunden am Tag getragen, anfangs mit Haube, später ohne. So gewöhnt der Vogel sich an den Falkner. Wenn der Vogel auf der Faust ruhig steht, können wir im Atzung auf der Faust anbieten und ihn an das Beutetier (Federspiel oder Balg) gewöhnen, das er später bejagen soll.

2.31 Sender - Welche Montagearten? Welchen der vorliegenden Sender für Rucksackmontage?

Antwort:

Ständerbefestigung: ist eine häufige Befestigungsart. Der Sender wird über dem Geschüh befestigt, was der Greif wie das Anlegen des Geschühs gewöhnt ist. Es ist eine sichere Montage, die allerdings, wenn der Beizvogel mit der Beute auf dem Boden steht, das schwächste Signal im Vergleich zu anderen Montagen liefert.

Stoßmontage: wird mit einer kleinen Metallmanschette der Sender an einer der Deckpennen befestigt. Dadurch bleiben die Hände des Beizvogels frei und das übermittelte Signal ist besser zu empfangen, wenn der Beizvogel auf dem Boden steht. Größter Nachteil ist, dass die Stoßfeder durch den Sender herausgezogen werden kann, z.B. beim Kampf des Beizvogels mit wehrhaften Wild wie Krähen. - 13-

Rucksackmontage: wird der Sender mit einer Klammer versehen, auf dem Rücken des Beizvogels wird ein schmales Metallplättchen zwischen den Schulterblättern von zwei Teflonbändern gehalten, die vom Rücken kommend kreuzförmig über die Brust und unter den Schwingen hindurch zurück zum Metallplättchen laufen. Von Vorteil ist, die Ständer sind frei von unnötigen Ballast und der Sender ist dem Vogel bei keiner seiner Aktivitäten im Wege und durch die höhere Position als bei der Ständermontage sind die Sendeeigenschaften besser.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Die Montage des Senders ist naturgemäß schwieriger und muss perfekt sitzen.

Von Vorteil ist, die Ständer sind frei von unnötigem Ballast und der Sender ist dem Vogel bei keiner seiner Aktivitäten im Wege und durch die höhere Position als bei der Ständermontage sind die Sendeeigenschaften besser. Die Montage des Senders ist naturgemäß schwieriger und muss perfekt sitzen.

2.32 Jungvogel über Nacht auf hohe Reck, was kann man tun? (Belis, Kamera)

Antwort: nicht unbeaufsichtigt lassen und zum Beispiel durch eine Bell oder eine Kamera überwachen.

2.33 Was ist ein Lehrprinz und ist dieser sinnvoll?

Antwort: Lehrprinz ist der erfahrene Falkner, von dem ich das Handwerk erlerne und der mir immer wieder bei Fragen zur Seite steht. So ein Lehrprinz ist sehr sinnvoll, da man hier die richtige Praxis des Falknerei lernt.

2.34 Jagdfreund bietet geschossene Krähen für Beizvogel an, wie reagiere Ich?

Antwort: Lehne ab, da ich nicht weiß, ob diese mit Blei geschossen wurde. Dies kann Entzündungen des Magen/Darms hervorrufen und den Vogel vergiften.

2.35 Geschühe

Antwort: Es gibt da Aylmeri-Geschüh oder auch Ösengeschüh genannt und das Knotengeschüh. Das Aylmeri-Geschüh besteht aus 2 Teilen pro Seite, den Manschette, die fest mit Ösen an den Ständern des Vogel befestigt werden und Geschühriemen, die einseitig einen Knoten haben und nicht durch die Öse rutschen. Das Knotengeschüh besteht aus nur einem etwas längeren Riemen, der durch eine bestimmte Flechttechnik am Ständer des Vogels befestigt wird.

2.36 Abtragen,

Antwort: „Der Vogel ist wie ein weißes Blatt Papier. Alles was der Vogel erlebt, bleibt bestehen.“ Unter dem Abtragen des Beizvogels versteht man, den BV für die Beizjagd zu zähmen und auf bestimmtes Wild einzujagen.

2.37 Transport

Antwort: Ein Falke/Habichtsartiger kann verhaubt auf der niederen Reck, dem Rücksitz, im Kofferraum, auf der Faust (wenn man selbst nicht fährt!!) in einer Cage oder einer Transportbox transportiert werden.

Bei der Transportbox ist wichtig: Mit griffiger Sitzstange, ausreichend Belüftungslöcher und die Ausrichtung der Sitzstange sollte längs in Fahrtrichtung angeordnet sein, dass ein Hin und Her-fallen des Vogels beim Bremsen und ein damit einhergehendes Flügelschlagen vermieden wird. Der Vogel schlägt sonst seine Schwingenfedern ab. Nervösen Vögeln kann man vor dem Transport das Gefieder besprühen, so ist der Vogel während der Fahrt mit dem Trocknen des Gefieders beschäftigt. Zusätzlich kann zum Schutz des Stoßes eine Manschette angebracht werden. Alle weiteren rechtlichen Bedingungen an den Transport und die Transportbox finden sich in der Transportverordnung.

2.38 Rötlicher Kot - was? Warum? Was kann man tun?

(Hatte ich bei euch nicht gehört und gelesen) Musste mich über den Tierarzt usw. langhangeln hab dann die Hilfestellung Coccidien erhalten und konnte mich dann über Atzung, Tauben und Hygiene retten.

Antwort: Mögliche Ursachen sind Verletzungen z.B. durch Fremdkörper, schwere Infektionen vor allem mit Bakterien, hochgradiger Parasitenbefall (z.B. Kokzidien), Vergiftungen (z.B. Schwermetalle). Oder eine Fütterung mit zu viel rotem Fleisch. Wichtig, immer zum Tierarzt gehen und eine Kotuntersuchung machen lassen.

2.39 Habichtsnestling: Aushorstung welches Federkleid, Großgefieder, Aufzucht (Kunsthorst wie, wo) Atzung (was, warum, was für Inhaltsstoffe notwendig (z.B. Kalzium und warum)) weiteres Vorgehen (Aufhauben, Aufschirren, Locke machen)

*Antwort: **Aushorsten Ablauf:***

- Horst finden
- Genehmigung zur Aushorstung von der unteren Jagdbehörde einholen
- Schriftliches Einverständnis des Revierinhabers
- Vornahme durch Jagdscheininhaber, da jagdliche Handlung
- Hatte man vorher noch keinen Vogel (Neubegründung): Vollzugsmeldung innerhalb 4 Wochen bei unterer Jagdbehörde; Hat man schon einen Vogel (Erweiterung): Vollzugsmeldung sofort
- Beringung: offener Ring mit Sollbruchstelle über WZF oder BNA, selbst dranmachen; Behörde kann Anwesenheit eines Vertreters verlangen
- (EU-) Bescheinigung von unterer Naturschutzbehörde, wobei das Ortsfeld freigelassen werden muss (Grund: für Tiere aus Anhang A, wenn sie nicht gezüchtet sind (Wildfang, ausgehorsteter Habicht, Zuchthabicht aus F1 Generation) braucht man für JEDEN Transport eine Transportgenehmigung (Ausnahme: Fahrt zum Tierarzt)) Wenn das Feld freigelassen wird, bedarf es dieser tausenden Transportgenehmigungen nicht.

Horst des Habichts:

Fingerdicke Äste, die stabil im Korb verflochten sind, feinere trockene Äste in der Mitte des Horstes, oft aus Lärche. In der Horstmitte befindet sich eine Mulde. So in etwa sollte auch ein Kusthorst aussehen. Wichtig, nicht in die direkte Sonne stellen – Austrocknungsgefahr!

Alter zur Aushorstung:

Frühestens im Alter von drei Wochen darf ein Habicht ausgehorstet werden, wie alt der Vogel ist, kann dem Status des Gefieders entnommen werden. Mit drei Wochen: Pennen 3-4cm, Kleingefieder an der Brust und dem Rücken zwischen dem weißen Dunenkleid sichtbar.

Atzung für den ausgehorsteten Habicht:

- 3-4 mal täglich atzen (Kükenherzen sind für die ersten Tage perfekt)
- Ab der 4. Lebenswoche kröpfen sie selbst
- Gewöllebildende Stoffe erst bei letzter Atzung des Tages verfüttern (aber frühestens nach einer Woche gewöllebildende Anteile zufüttern)
- Zufüttern von Kalk und evtl. Vitamin-D, um Rachitis zu vermeiden
- Fein fasriges Fleisch füttern, artgemäß, abwechslungsreich und nahrhaft

Weiteres Vorgehen:

- Habicht ist nach circa 8 Wochen trocken, Gefieder vollständig ausgebildet und keine Blutkiele (Kiele des Großgefieders sind ausgehärtet und haben kein Blut mehr im Kiel) mehr.
- Sollte der Ästling zu ungestüm sein bis er trocken ist, empfiehlt es sich ihn in der Mauserkammer zu halten, bis er trocken ist. Dann kann er sich nicht groß verletzen.
- Die Kombi, aus Altvogel-Aufzucht und Menschen-Aufzucht nennt man übrigens Teilprägung. Nur Altvogel-Aufzucht heißt – Altvogelprägung und reine Menschen-Aufzucht heißt Im-Print.
- Aufschirren sollte zu zweit passieren in Handtuch eingewickelt – einer hält, einer schirrt auf.
- Das Verhauben sollte man langsam und behutsam üben und den Vogel daran gewöhnen.

2.40 Schmelz: wie kann er aussehen, was kann man daraus erkennen, Krankheiten:

Welche Arten sind möglich, z.B. Gelber Knopf (wie erkennbar, Maßnahmen)

Antwort:

- Rötliche Färbung: Blut im Kot – z.B. Kokzidien
- Harnanteil grün: Erkrankung mit Leber und Nieren-Beteiligung, Hungerkot

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

- Kotanteil gelblich: Körnig : nach Füttern mit hellem, fettreichen Fleisch
 - Kotanteil dunkel bis schwarz: nach Füttern mit rotem Fleisch, wie Rinderherz
- Prophylaktisch empfehlen sich zwei Kotproben im Jahr, Prinzipiell sollte man immer den Tierarzt aufsuchen, sobald man Veränderungen am Vogel feststellt (Verhalten, Aussehen - Augen, Gefieder, Kropf, Brustmuskulatur, Schmelz ...)

2.41 Shiften?

wie, welche Materialien (kein Metall) Dämpfen von Federn: wie, wie oft möglich

Antwort: Ist der Federkiel nicht der Länge nach aufgespalten und hängt das Bruchstück noch an der Feder, trennt man die Feder an der Bruchstelle mit einem Skalpell quer durch. Anschließend passt man eine Schiftnadel etwa 2cm tief in den hohlen Kiel ein und zwar in beide Kielenden. Die Schiftnadeln werden aus Bambusholz, glasfaserverstärktem Kunststoff oder Kohlefaser gefertigt. Sie sind in Größe und Querschnitt jeweils dem Kiel der zu schiftenden Penne angepasst und an den Enden etwas verjüngt.

2.42 Lüften: wie und warum?

- Antwort:*
- 1) Beizvögel am Block / Sprenkel Luft und Sonnenlicht genießen lassen
 - 2) Lüften bedeutet dem Beizvogel die Falkenhaube für kurze Zeit abnehmen.
 - 3) Der Beizvogel lüftet sein Gefieder, wenn er es in Sonne und Luft sträubt.
- (alle Quellen aus dem Internet)*

2.43 Flugdrahtanlage beschreiben, wie lang für Habicht, Falke, Adler?

Schutz vor Witterung, Feinden

Antwort: Ist ein Stahlrohr oder Stahlseil, das dem Vogel einen erweiterten Aktionsradius ermöglicht. Der Vogel kann hier während der Mauser, der Beizsaison oder auch ganzjährig gehalten werden.

Kriterien:

- Material aus V2A
- Pufferung am Ende des Rohres, damit Vogel langsamer und nicht abrupt abgebremst wird.
- Flug- und Laufbereich muss frei sein und keine Verletzungsgefahr bergen
- Laufring darf nicht verkeilen oder verhängen
- Herausziehen der Anlage muss verhindert werden – fest im Boden verankern
- Standort muss ruhig sein und schattige und sonnige Stellen haben

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

- Mind. 2 Sitzmöglichkeiten bieten
- Witterungsschutz – Unterstand (3seitig geschlossen)
- Boden entweder Kies/Schotter oder gemähter Rasen
- Kann mit einem raubzeugsicheren Gitter geschützt werden außen herum
- Wenn zur ganzjährigen Haltung, muss Badebrente vorhanden sein
- Länge dem Vogel entsprechend:
 - o Mind. 4 m – Max 15 m
 - o Vögel mit hoher Startgeschwindigkeit nicht länger, als 6 m

2.44 Reck beschreiben und wann wird es benutzt.

Antwort: dient zum Abstellen des Vogels, während der Zeit des Abtragens, wenn man den Vogel nicht auf der Faust tragen möchte

- Der Vogel muss erst das Aufschwingen beherrschen
- Nie unbeaufsichtigt lassen – akustische Kontrolle – Bell

Beschreiben:

Es besteht aus dem

- Reckrahmen,
- dem Recktuch (dicht gewebtes Leinen, Leder oder Zellstoff, darf keine Fäden ziehen und muss ein Verhängen des BVs verhindern) und
- der Reckstange (für Habichtsartige abgerundet z.B. Holzstab mit Hanfseil umwickelt – für Falken abgeflacht z.B. spaltfreier Korkrinde bündig aufgeleimt)

Vogel wird direkt mit der Drahle an der Reckstange angebunden, Ausnahme beim Habicht, hier benötigt es zusätzlich die Kurzfessel wegen des langen Stoßes.

2.45 Anlegen des Geschühs am Wanderfalkenpräparat

Antwort: Ring hochschieben und das Geschüh als unterstes anlegen.

2.46 Unterschiede Aylmeri- und Knotengeschüh erklären

Antwort: Es gibt da Aylmeri-Geschüh oder auch Ösengeschüh genannt und das Knotengeschüh. Das Aylmeri-Geschüh besteht aus 2 Teilen pro Seite, den Manschette, die fest mit Ösen an den Ständern des Vogel befestigt werden und Geschühriemen, die einseitig einen Knoten haben und nicht durch die Öse rutschen. Das Knotengeschüh besteht aus nur einem etwas längeren Riemen, der durch eine bestimmte Flechttechnik am Ständer des Vogels befestigt wird.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

2.47 Vor- und Nachteile der beiden Geschühtypen

Antwort: **Aylmeri-Geschüh / Ösengeschüh:**

Nachteile:

- Manschetten bleiben ständig am Vogel
- Manschetten müssen bei Wechsel aufgeschnitten werden
- Man könnte einen Geschühriemen verlieren, weil nur durchgefädelt

Vorteile:

- Geschühriemen können leicht entfernt werden für z.B. freie Folge
- Bei Verschleiß der Riemen müssen nur die Riemen ausgetauscht werden, ohne am Vogel Handanlegen zu müssen

Knotengeschüh:

Nachteile:

- Geschühriemen bleiben immer am Vogel – Verhängungsgefahr
- Bei Verschleiß muss alles ausgetauscht werden

Vorteile:

- Vogel ist immer fertig aufgeschirrt an den Ständern
- Eine feste unlösbare Verbindung zwischen Riemen und Vogel

Fällt Dir noch mehr ein?

2.48 Tuberkulose – Maßnahmen

in Bezug auf Hygiene / Behandlung Ja- Nein

Antwort: Da Virus beständig gegenüber Desinfektionsmittel und eine sehr hohe Überlebensfähigkeit, sofortiges Aufsuchen des Tierarztes.

Es handelt sich hierbei um eine Faktorenerkrankung (mehrere ungünstige Faktoren führen zur Erkrankung)

Chronisch verlaufend, starke Abmagerung, Veränderung an Lunge, Haut und Muskulatur, Verdauungstrakt

Zoonose, darum Therapie kritisch betrachten, Therapien haben allerdings oft wenig Aussicht hierbei

2.49 Hygiene In der Voliere

Antwort: Hygiene= alle Maßnahmen, die zur Erhaltung der Gesundheit erforderlich sind!

Bei hohem Infektionsdruck (z.B. viele Besucher, häufiger Tierwechsel, gemeinsame Aufstellung, Stress, geringe Immunität, z.b. Gerfalke bei Aspergillus) erfordert dies Hygienemaßnahmen:

- Nicht essen und trinken in Voliere
- Voliere sauber halten

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

- Arbeitsplätze (Futterkammer, Gefrierboxen,..) sauber halten
- Handschuh sauber halten
- Säubern nach Gebrauch
- Beim Wechseln der Voliere Schuhe... sauber machen

2.50 Zählen sie alle Krankheiten auf die sie kennen

Antwort:

Viren:

- Newcastle Disease (Geflügelpest, anzeigepflichtig!)
- Geflügelpocken (in wärmeren Ländern, meldepflichtig!)
- Herpesvirusinfektion
- Tollwut

Bakterien:

- Salmonellen-Infektion (Hygiene)
- Pasteurella-Infektion (Katzen- und Hundebisse)
- Chlamydien-Infektion
- Clostridien-Infektionen (Botulismus)
- Tuberkulose (Faktorenerkrankung)

Pilze:

- Aspergillose (bei feucht warmen Klima, Faktorenerkrankung, Atemprobleme, Therapie problematisch, weil Luftsäcke schwer erreichbar)
- Candidiasis (Pilzbefall der Schleimhäute, übermäßiger Antibiotikagebrauch, Stress, kann prophylaktisch behandelt werden)

Parasiten:

- Trichomonaden (übertragbar von Tauben aus Kropf und Speiseröhre)
- Kokizidien (Faktorenerkrankung, blutiger oder wässriger Durchfall)
- Würmer
- Trichinellen
- Ektoparasiten (Zecken, Milben, Federspulmilben, Grabmilben, Federlinge, Lausfliegen, Gefiederfliegen, Schmeiß- und Fleischfliegen)

Mangelzustände:

- Vitamin A Mangel (Verfüttern von reinem Fleisch – Trübung der Nickhaut, ausgetrocknete Hornhaut)
- Vitamin B Mangel (Durch Verfüttern von reinem Muskelfleisch – Gleichgewichtsstörungen, Krämpfe, Sternguckerkrankheit,...)
- Vitamin D Mangel (fehlendes UV-Licht, gut wären 45 min täglich Sonne – Rachitis, gestörte Eierschalenbildung)
- Gicht (Harnsäure wird nicht mehr über die Nieren ausgeschieden und lagert sich in Gelenken ab)

Dicke Hände = Veränderung an den Fußballen mit bakteriellen Entzündungen des Bänder- und Sehnenapparates; Ursachen: Gicht, kleine Hautwunden, ungeeignete Aufblockeinrichtungen, Unfall, Kampf; prophylaktisch: genügend Bewegung, Übergewicht vermeiden, Aufblockeinrichtung prüfen, Wundbehandlung und Selbstverletzung vermeiden

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Mechanische/Chemische Ursachen:

- Stoß, Aufprall, Schlag – Stauchung, Gehirnerschütterung oder Frakturen
- Bleivergiftung
- Barbituratvergiftung bei Narkose
- Kuminvergiftung durch Rattengift
- Organophosphatvergiftung durch Insektenvernichtungsmittel
- Pestizidvergiftung durch Pflanzenschutzmittel

Ernährungsbedingte Ursachen:

- Verbrennungen durch zu heiße Nahrung – Mikrowellen
- Fehlgärung durch Aufnahme gefrorener Nahrung
- Sandanschoppung durch „panierte Nahrung“
- Gewöllanschoppung bei Futteraufnahme ohne ausreichende Futterpausen
- Mangelzustände bei zu wenig/falscher Nahrung

2.51 Welche Krankheiten können von anderen Tieren auf Greifvögel übertragen werden?

Antwort:

- Newcastle Disease (infizierte Hühner, Krähen, Fasane, Tauben)
- Geflügelpocken (über Insekten)
- Herpesviren (von Tauben)
- Tollwut (Bisse von Säugetieren)
- Bakterien aller Art (z.B. Salmonellen- Wassergeflügel, Pasteurella – Hundebisse, Tuberkulose – infizierter Kot)
- Parasiten (Ekto- und Endoparasiten)

2.52 Wie erkennen sie Trichomonaden? Was sind Trichomonaden? Wie untersuchen sie diese? Sind diese tödlich bzw. wie verläuft die Krankheit?

Antwort: Gelber Knopf – gelbliche Belege und unangenehmer Geruch im Rachenraum, die Tiere magern ab und oftmals ist das Gefieder aufgeplustert. Ist hochgradig infektiös und sollte durch einen Abstich beim Tierarzt sofort diagnostiziert und behandelt werden. Wird der Parasitenbefall rechtzeitig erkannt, kann er gut behandelt werden.

2.53 Wie erkennen sie Kokzidien? Was sind Kokzidien? Wie untersuchen sie diese? Sind diese tödlich bzw. wie verläuft die Krankheit?

Antwort: Kokzidien erkennt man durch wässrigen oder blutigen Kot, Abmagerung und durch den Durchfall Dehydration. Es handelt sich hierbei um eine Faktorenenerkrankung. Eindeutige Diagnostik durch Kotuntersuchung beim Tierarzt. Behandelt wird dies mit Antibiotikum und optimaler Hygiene!

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

2.54 Welche Haltungsformen kennen sie?

Antwort: Anbindehaltung (Hohes Reck, Block, Sprenkel, Flugdrahtanlage) oder Volierenhaltung (Voliere, Zuchtvoliere, Mauserkammer, Reckkammer)

2.55 Wie ist eine Flugdrahtanlage aufgebaut? Auf was müssen sie bei der Länge achten?

Antwort: Ist ein Stahlrohr oder Stahlseil, das dem Vogel einen erweiterten Aktionsradius ermöglicht. Der Vogel kann hier während der Mauser, der Beizsaison oder auch ganzjährig gehalten werden.

Kriterien:

- *Material aus V2A*
- *Pufferung am Ende des Rohres, damit Vogel langsamer und nicht abrupt abgebremst wird.*
- *Flug- und Laufbereich muss frei sein und keine Verletzungsgefahr bergen*
- *Laufriem darf nicht verkeilen oder verhängen*
- *Herausziehen der Anlage muss verhindert werden – fest im Boden verankern*
- *Standort muss ruhig sein und schattige und sonnige Stellen haben*
- *Mind. 2 Sitzmöglichkeiten bieten*
- *Witterungsschutz – Unterstand (3seitig geschlossen)*
- *Boden entweder Kies/Schotter oder gemähter Rasen*
- *Länge dem Vogel entsprechend:*
 - o *Mind. 4 m – Max 15 m*
 - o *Vögel mit hoher Startgeschwindigkeit nicht länger, als 6 m*

2.56 Wie ist eine Reckkammer aufgebaut?

Antwort: Besonders geeignet für Wildfänge oder Mauservögel, die nicht in der Mauserkammer sind, zum Ruhigstellen.

Beizvogel wird darin abgestellt, wenn nicht gearbeitet wird.

Unterbringung in der Nacht, bei schlechtem Wetter oder für kranke Vögel, Aufbau:

- *Allseits geschlossener Raum, abgedunkelter Raum*
- *Schalldicht (Schwierig wegen der Aufsicht auf dem Reck)*
- *Mittig mit Hohem Reck*
- *Reck immer parallel zur Lichtquelle (Ein MUSS für jede Halteform!)*

2.57 Was müssen sie beachten, wenn sie einen Greifvogel auf das hohe Reck stellen?

Antwort: dient zum Abstellen des Vogels, während der Zeit des Abtragens, wenn man den Vogel nicht auf der Faust tragen möchte

- *Der Vogel muss erst das Aufschwingen beherrschen*
- *Nie unbeaufsichtigt lassen – akustische Kontrolle – Bell*
- *Beim Habicht die Kurzfessel zusätzlich verwenden*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Beschreiben:

Es besteht aus dem

- *Reckrahmen,*
- *dem Recktuch (dicht gewebtes Leinen, Leder oder Zellstoff, darf keine Fäden ziehen und muss ein Verhängen des BVs verhindern) und*
- *der Reckstange (für Habichtsartige abgerundet z.B. Holzstab mit Hanfseil umwickelt – für Falken abgeflacht z.B. spaltfreier Korkrinde bündig aufgeleimt)*

Vogel wird direkt mit der Drahle an der Reckstange angebunden, Ausnahme beim Habicht, hier benötigt es zusätzlich die Kurzfessel wegen des langen Stoßes.

2.58 Was machen sie nach der Mauser?

Antwort: den Vogel wiegen, vom hohen Mausergewicht langsam herunterbringen, hier fehlen noch Infos

2.59 Wie ermitteln sie das optimale Gewicht ihres Greifvogels?

*Antwort: ideales Jagdgewicht 10-15% weniger, als Mausergewicht
20% weniger ist zum Einfliegen des Vogels vertretbar
Konditionierung unter 20-25% nicht vertretbar
Vogel regelmäßig wiegen*

2.60 Was ist ein Geschüh? Aus welchen Bestandteilen besteht es? Was müssen sie beim Anlegen beachten?

*Antwort: die beiden Lederriemen an den Händen bzw. Füßen den Greifvogels. Sie werden dazu verwendet den Vogel auf der Faust zu sichern und in der Falknerischen Anbindehaltung fest zu machen.
Geschühriemen (mit oder ohne Ösen-Manschette), Adresstäfelchen, Bell mit Bellriemen.
Wichtig beim Anlegen ist, dass der Geschühriemen unter dem Ring angebracht wird und der Bellriemen über dem Ring.*

2.61 Aufbau einer Flugdrahtanlage

(Mindestmaße / Maximale Maße, erforderliches Zubehör)

Antwort: Ist ein Stahlrohr oder Stahlseil, das dem Vogel einen erweiterten Aktionsradius ermöglicht. Der Vogel kann hier während der Mauser, der Beizsaison oder auch ganzjährig gehalten werden.

Kriterien:

- *Material aus V2A*
- *Pufferung am Ende des Rohres, damit Vogel langsamer und nicht abrupt abgebremst wird.*
- *Flug- und Laufbereich muss frei sein und keine Verletzungsgefahr bergen*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

- Laufring darf nicht verkeilen oder verhängen
- Herausziehen der Anlage muss verhindert werden – fest im Boden verankern
- Standort muss ruhig sein und schattige und sonnige Stellen haben
- Mind. 2 Sitzmöglichkeiten bieten
- Witterungsschutz – Unterstand (3seitig geschlossen)
- Boden entweder Kies/Schotter oder gemähter Rasen
- Kann mit einem raubzeugsicheren Gitter geschützt werden außen herum
- Wenn zur ganzjährigen Haltung, muss Badebrente vorhanden sein
- Länge dem Vogel entsprechend:
 - o Mind. 4 m – Max 15 m
 - o Vögel mit hoher Startgeschwindigkeit nicht länger, als 6 m

2.62 Was ist bei Spitzhütte zu beachten?

(Standortwahl, Gefahren)

Antwort: dreiseitig geschlossener Unterstand mit Block oder Sprenkel, an dem der Vogel überdacht angebunden werden kann.

Schrägflächen des Daches verhindert aufblocken.

Mit Rückseite am besten in eine geschützte Ecke stellen, wo keine Fressfeinde hinkommen können.

Die Hütte dient als Rückzugsort und zum Schutz vor Witterung.

Weitere Kriterien:

- *Material muss gesundheitsunschädlich sein*
- *Verletzungssicher gebaut*
- *Abmessungen, dass sich Vogel art- und verhaltensgerecht bewegen kann*
- *Aufblockmöglichkeit so wählen, dass Stoß mind. 10 cm Abstand zum Boden hat*
- *Muss leicht zu reinigen sein*

2.63 Haltung am Reck

(Aufsichtspflicht, Legitimität der Reckhaltung für Vogel mit / ohne Freiflug)

Antwort: Aufsichtspflicht am hohen Reck, durch z.B. akustische Kontrolle mit Bell. „Da die Bewegungsfreiheit des Vogel auf der Reck erheblich eingeschränkt ist, ist die Haltungsform nur in den ersten Tagen der Ausbildung ganztägig, sonst nur in der Zeit des Freifluges während weniger Stunden oder in der Zeit der Nachtruhe statthaft. Das Unterfliegen des Recks ist zu verhindern.“ (4.3 - Mindestanforderungen an die Haltung von Greifvögeln und Eulen)

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

2.64 Komfortverhalten des Greifvogels

(Hinlegen/Badebrente...)

Antwort: Inneneinrichtung der Voliere:

- *Badebrente*
- *Liegebrett*
- *Mehrere Sitzmöglichkeiten*
- *Rückzugsmöglichkeit für den Vogel*
- *Fütterungseinrichtung*

Alles in einer Größe der Gesamtlänge des Vogels

2.65 Wildfang im Sack → was ist bei Entnahme des Vogels zu beachten

(Anzahl der benötigten Leute, Eigenschutz, Greifvogelfixierung, wo und wie Sack öffnen)

Antwort:

2.66 Greifvogelkrankheiten

(bakt./viral/Ekto-/Endoparasiten)

Antwort:

Viren:

- *NewCastle Disease (Geflügelpest, anzeigepflichtig!)*
- *Geflügelpocken (in wärmeren Ländern, meldepflichtig!)*
- *Herpesvirusinfektion*
- *Tollwut*

Bakterien:

- *Salmonellen-Infektion (Hygiene)*
- *Pasteurella-Infektion (Katzen- und Hundebisse)*
- *Chlamydien-Infektion*
- *Clostridien-Infektionen (Botulismus)*
- *Tuberkulose (Faktorenerkrankung)*

Pilze:

- *Aspergillose (bei feucht warmen Klima , Faktorenerkrankung, Atemprobleme, Therapie problematisch, weil Luftsäcke schwer erreichbar)*
- *Candidiasis (Pilzbefall der Schleimhäute, übermäßiger Antibiotikagebrauch, Stress, kann prophylaktisch behandelt werden)*

Parasiten:

- *Trichomonaden (übertragbar von Tauben aus Kropf und Speiseröhre)*
- *Kokizidien (Faktorenerkrankung, blutiger oder wässriger Durchfall)*
- *Würmer*
- *Trichinellen*
- *Ektoparasiten (Zecken, Milben, Federspulmilben, Grabmilben, Federlinge, Lausfliegen, Gefiederfliegen, Schmeiß- und Fleischfliegen)*

Mangelzustände:

- *Vitamin A Mangel (Verfüttern von reinem Fleisch – Trübung der Nickhaut, ausgetrocknete Hornhaut)*
- *Vitamin B Mangel (Durch Verfüttern von reinem Muskelfleisch – Gleichgewichtsstörungen, Krämpfe, Sternguckerkrankheit,...)*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

- Vitamin D Mangel (fehlendes UV-Licht, gut wären 45 min täglich Sonne – Rachitis, gestörte Eierschalenbildung)
- Gicht (Harnsäure wird nicht mehr über die Nieren ausgeschieden und lagert sich in Gelenken ab)

Dicke Hände = Veränderung an den Fußballen mit bakteriellen Entzündungen des Bänder- und Sehnenapparates; Ursachen: Gicht, kleine Hautwunden, ungeeignete Aufblockeinrichtungen, Unfall, Kampf ; prophylaktisch: genügend Bewegung, Übergewicht vermeiden, Aufblockeinrichtung prüfen, Wundbehandlung und Selbstverletzung vermeiden

Mechanische/Chemische Ursachen:

- Stoß, Aufprall, Schlag – Stauchung, Gehirnerschütterung oder Frakturen
- Bleivergiftung
- Barbituratvergiftung bei Narkose
- Kuminvergiftung durch Rattengift
- Organophosphatvergiftung durch Insektenvernichtungsmittel
- Pestizidvergiftung durch Pflanzenschutzmittel

Ernährungsbedingte Ursachen:

- Verbrennungen durch zu heiße Nahrung – Mikrowellen
- Fehlgärung durch Aufnahme gefrorener Nahrung
- Sandanschoppung durch „panierte Nahrung“
- Gewöllanschoppung bei Futteraufnahme ohne ausreichende Futterpausen
- Mangelzustände bei zu wenig/falscher Nahrung

2.67 Der Kranke Vogel → Auffälligkeiten in Gefieder, Verhalten...

Antwort:

Anzeichen für Krankheiten bei Vögeln:

- Fressunlust, nicht putzen nach dem Fressen
- Aufplustern, Kopf einziehen, Flügel hängen lassen, Kraftlosigkeit
- Tränende Augen, niesen, Nasenlöcher verklebt
- Desinteresse, ungewohnte Akzeptanz
- Veränderte unphysiologische Körperhaltung
- In Konsistenz und Farbe veränderter Kot

Kontrolle der Gesundheit:

- Verhalten, Ernährungszustand, Pflegezustand, Allgemeinbefinden
- Augen, Augenlider, Nasenlöcher, Wachshaut am Oberschnabel, Schnabel
- Atmung über offenen Schnabel oder Nasenlöcher
- Kropf, Verletzungen, Federn, unbefiederte Bereiche
- Durchtasten von Kopf, Hals, Kropf, Brustmuskulatur

2.68 Geschüh beschreiben

Unterschied Aylmeri und Knotengeschüh

Antwort: Es gibt da Aylmeri-Geschüh oder auch Ösengeschüh genannt und das Knotengeschüh. Das Aylmeri-Geschüh besteht aus 2 Teilen pro Seite, den Manschette, die fest mit Ösen an den Ständern des Vogel befestigt werden und Geschühriemen, die einseitig einen Knoten

haben und nicht durch die Öse rutschen. Das Knotengeschüh besteht aus nur einem etwas längeren Riemen, der durch eine bestimmte Flechttechnik am Ständer des Vogels befestigt wird.

2.69 Anlegen von Geschüh

Antwort: Anlegen zu zweit, Vogel in ein Tuch einschlagen, evtl. Verhauben, alles vorbereiten, damit es möglichst schnell geht, Geschüh unter Ring anlegen

2.70 Reckkammer Funktionsweise

Antwort: Besonders geeignet für Wildfänge oder Mauservögel, die nicht in der Mauserkammer sind, zum Ruhigstellen. Beizvogel wird darin abgestellt, wenn nicht gearbeitet wird. Unterbringung in der Nacht, bei schlechtem Wetter oder für kranke Vögel

Aufbau:

- *Allseits geschlossener Raum, abgedunkelter Raum*
- *Schalldicht (Schwierig wegen der Aufsicht auf dem Reck)*
- *Mittig mit Hohem Reck*
- *Reck immer parallel zur Lichtquelle (Ein MUSS für jede Halteform!)*

2.71 Aufzucht Habicht- Aushorstung: wann am Besten entnehmen, wie füttern, wann trocken, wann mit Training beginnen, wie unterbringen, wie Training abläuft

Antwort:

Aushorsten Ablauf:

- *Horst finden*
- *Genehmigung zur Aushorstung von der unteren Jagdbehörde einholen*
- *Schriftliches Einverständnis des Revierinhabers*
- *Vornahme durch Jagdscheininhaber, da jagdliche Handlung*
- *Hatte man vorher noch keinen Vogel (Neubegründung): Vollzugsmeldung innerhalb 4 Wochen bei unterer Jagdbehörde; Hat man schon einen Vogel (Erweiterung): Vollzugsmeldung sofort*
- *Beringung: offener Ring mit Sollbruchstelle über WZF oder BNA, selbst dranmachen; Behörde kann Anwesenheit eines Vertreters verlangen*
- *(EU-) Bescheinigung von unterer Naturschutzbehörde, wobei das Ortsfeld freigelassen werden muss (Grund: für Tiere aus Anhang A, wenn sie nicht gezüchtet sind (Wildfang, ausgehorsteter Habicht, Zuchthabicht aus F1 Generation) braucht man für JEDEN Transport eine Transportgenehmigung (Ausnahme: Fahrt zum Tierarzt)) Wenn das Feld freigelassen wird, bedarf es dieser tausenden Transportgenehmigungen nicht.*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Horst des Habichts:

Fingerdicke Äste, die stabil im Korb verflochten sind, feinere trockene Äste in der Mitte des Horstes, oft aus Lärche. In der Horstmitte befindet sich eine Mulde. So in etwa sollte auch ein Kusthorst aussehen. Wichtig, nicht in die direkte Sonne stellen – Austrocknungsgefahr!

Alter zur Aushorstung:

Frühestens im Alter von drei Wochen darf ein Habicht ausgehorstet werden, wie alt der Vogel ist, kann dem Status des Gefieders entnommen werden. Mit drei Wochen: Pennen 3-4cm, Kleingefieder an der Brust und dem Rücken zwischen dem weißen Dunenkleid sichtbar.

Atzung für den ausgehorsteten Habicht:

- 3-4 mal täglich atzen (Kükenherzen sind für die ersten Tage perfekt)
- Ab der 4. Lebenswoche kröpfen sie selbst
- Gewöllebildende Stoffe erst bei letzter Atzung des Tages verfüttern (aber frühestens nach einer Woche gewöllebildende Anteile zufüttern)
- Zufüttern von Kalk und evtl. Vitamin-D, um Rachitis zu vermeiden
- Fein fasriges Fleisch füttern, artgemäß, abwechslungsreich und nahrhaft

Weiteres Vorgehen:

- Habicht ist nach circa 8 Wochen trocken, Gefieder vollständig ausgebildet und keine Blutkiele (Kiele des Großgefieders sind ausgehärtet und haben kein Blut mehr im Kiel) mehr.
- Sollte der Ästling zu ungestüm sein bis er trocken ist, empfiehlt es sich ihn in der Mauserkammer zu halten, bis er trocken ist. Dann kann er sich nicht groß verletzen.
- Die Kombi, aus Altvogel-Aufzucht und Menschen-Aufzucht nennt man übrigens Teilprägung. Nur Altvogel-Aufzucht heißt – Altvogelprägung und reine Menschen-Aufzucht heißt Im-Print.
- Aufschirren sollte zu zweit passieren in Handtuch eingewickelt – einer hält, einer schirrt auf.
- Das Verhauben sollte man langsam und behutsam üben und den Vogel daran gewöhnen.

2.72 Unterschiedliche Nahrung von GV- welche am Besten, wieviel

Antwort: frisch, ausgewogen, vielseitig, artgerecht und ausreichend
Lebendfütterung ist verboten!!

Atzung sollte nicht in Schmelz gelegen haben

Vor Tötung des Futtertieres – betäuben (Tierschutzgesetz)

Bei Tauben den Kopf, Kropf, Füße entfernen und am besten 2 Wochen einfrieren

Kein Schwein

Reh für Bussarde und Falken nicht geeignet

Tauben, Wildfleisch, Hühner, Bisam, Kaninchen, Küken, ...

Einschließlich Haut, Knochen, Knorpel, Fell, ...

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

2.73 Was ist Kondition und Motivation, woran erkennt man, ob hohe Kondition

Antwort:

Kondition – nötige körperliche Verfassung

Ist die körperliche Verfassung eines BV in Bezug auf eine zu erbringende Leistung. Da bei einem BV vor allem das Jagdvermögen die zu erbringende Leistung darstellt, ist, mit anderen Worten, die Jagdkondition eines BV dessen zur Beizjagd notwendige körperliche Verfassung.

- **Gesundheitszustand**
- **Ernährungszustand**
- **Haltungszustand**
- **Trainingszustand**
- (Klimatische Umweltbedingungen)

Motivation – nötige mentale/psychische Verfassung

Ist, bezogen auf die Falknerei, die Bereitschaft eines BVs zur Jagdausübung, oder mit anderen Worten, dessen Beutebereitschaft. Die Motivation ist damit neben der Kondition die zweite maßgebliche Determinante der jagdlichen Leistungsfähigkeit eines BVs.

2.74 Was wichtig bevor man auf Jagd geht:

Wiegen

Antwort: Vogel wiegen und lüften lassen, um das Risiko zu Schweimen zu reduzieren (nicht Mittags fliegen lassen)

2.75 Was muss ich beachten oder vorbereiten bevor ich mir einen Jungvogel vom Züchter hole

Antwort:

Fragen stellen:

- Genug Zeit?
- Eigene Eignung?
- Welchen Zweck?
- Genügend Platz?
- Genügend Atzung, woher?
- Ausweichmöglichkeiten?
- Woher Gerätschaften zur Reinigung, Abtragen und Ausbildung?
- Art des Vogels?

Falknerprüfung bestehen – Versicherung abschließen –
Falknerjagdschein lösen

2.76 Bestes Fleisch das ich Füttern kann

= Taube

Antwort: Küken *weitere Infos – schwierige Frage?*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

2.77 Was muss ich beim Verfüttern von Tauben beachten?

*Antwort: sehr nahrhaftes Fleisch, keinem Vogel geben, der zu tief ist!
Kropf, Kopf, Innereien und Füße entfernen und am besten 2 Wochen einfrieren vor der Fütterung*

2.78 Woran erkenne ich Krankheiten meines Vogels?

Antwort:

Anzeichen für Krankheiten bei Vögeln:

- *Fressunlust, nicht putzen nach dem Fressen*
- *Aufplustern, Kopf einziehen, Flügel hängen lassen, Kraftlosigkeit*
- *Tränende Augen, niesen, Nasenlöcher verklebt*
- *Desinteresse, ungewohnte Akzeptanz*
- *Veränderte unphysiologische Körperhaltung*
- *In Konsistenz und Farbe veränderter Kot*

Kontrolle der Gesundheit:

- *Verhalten, Ernährungszustand, Pflegezustand, Allgemeinbefinden*
- *Augen, Augenlider, Nasenlöcher, Wachshaut am Oberschnabel, Schnabel*
- *Atmung über offenen Schnabel oder Nasenlöcher*
- *Kropf, Verletzungen, Federn, unbefiederte Bereiche*
- *Durchtasten von Kopf, Hals, Kropf, Brustmuskulatur*

2.79 Geschüh anlegen

unterhalb des Ringes

Antwort: Anlegen zu zweit, Vogel in ein Tuch einschlagen, evtl. Verhauben, alles vorbereiten, damit es möglichst schnell geht, Geschüh unter Ring anlegen

2.80 Aylmerie-Geschüh und Knotengeschüh benennen, zeigen, Unterschiede aufzeigen!

Antwort: Es gibt da Aylmeri-Geschüh oder auch Ösengeschüh genannt und das Knotengeschüh. Das Aylmeri-Geschüh besteht aus 2 Teilen pro Seite, den Manschette, die fest mit Ösen an den Ständern des Vogel befestigt werden und Geschühriemen, die einseitig einen Knoten haben und nicht durch die Öse rutschen. Das Knotengeschüh besteht aus nur einem etwas längeren Riemen, der durch eine bestimmte Flechttechnik am Ständer des Vogels befestigt wird.

2.81 Was bringen Sie beim Abholen des Habichts zum Züchter mit?

Antwort: Den Falknerjagdschein, ein Geschüh, Transportbox, ... weitere Dinge??

2.82 Wie gehen Sie weiter vor, wenn Sie einen Habicht beim Züchter abholen?

Antwort: **Atzung für den ausgehorsteten Habicht:**

- 3-4 mal täglich atzen (Kükenherzen sind für die ersten Tage perfekt)
- Ab der 4. Lebenswoche kröpfen sie selbst
- Gewöllebildende Stoffe erst bei letzter Atzung des Tages verfüttern (aber frühestens nach einer Woche gewöllebildende Anteile zufüttern)
- Zufüttern von Kalk und evtl. Vitamin-D, um Rachitis zu vermeiden
- Fein fasriges Fleisch füttern, artgemäß, abwechslungsreich und nahrhaft

Weiteres Vorgehen:

- Habicht ist nach circa 8 Wochen trocken, Gefieder vollständig ausgebildet und keine Blutkiele (Kiele des Großgefieders sind ausgehärtet und haben kein Blut mehr im Kiel) mehr.
- Sollte der Ästling zu ungestüm sein bis er trocken ist, empfiehlt es sich ihn in der Mauserkammer zu halten, bis er trocken ist. Dann kann er sich nicht groß verletzen.
- Die Kombi, aus Altvogel-Aufzucht und Menschen-Aufzucht nennt man übrigens Teilprägung. Nur Altvogel-Aufzucht heißt – Altvogelprägung und reine Menschen-Aufzucht heißt Im-Print.
- Aufschirren sollte zu zweit passieren in Handtuch eingewickelt – einer hält, einer schirrt auf.
- Das Verhauben sollte man langsam und behutsam üben und den Vogel daran gewöhnen.

2.83 Wie transportieren sie den Habicht nach Hause?

Antwort: in einer dunklen aber luftigen Transportbox nach der Transportverordnung

2.84 Was machen Sie zuhause mit dem jungen Habicht?

Antwort: in die Reckkammerstellen und den Vogel sich langsam an einen gewöhnen lassen. Dann beginnen den Vogel auf der Faust ans Tragen zu gewöhnen, wenn möglich verhaubt. So lange üben, bis der Vogel locke ist im Umgang mit dem Falkner.

Fehlen hier noch Infos?

2.85 Wie füttern Sie den Habicht?

Antwort: **Atzung für den (ausgehorsteten) Habicht:**

- 3-4 mal täglich atzen (Kükenherzen sind für die ersten Tage perfekt)
- Ab der 4. Lebenswoche kröpfen sie selbst
- Gewöllebildende Stoffe erst bei letzter Atzung des Tages verfüttern (aber frühestens nach einer Woche gewöllebildende Anteile zufüttern)

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

- Zufüttern von Kalk und evtl. Vitamin-D, um Rachitis zu vermeiden
- Fein fasriges Fleisch füttern, artgemäß, abwechslungsreich und nahrhaft

2.86 Was machen Sie, wenn er sich kontinuierlich weigert Atzung von der Faust anzunehmen

Antwort: **Verhaubt füttern? Nicht hungern lassen!!**

2.87 Was sind dicke Hände?

Antwort: Dicke Hände = Veränderung an den Fußballen mit bakteriellen Entzündungen des Bänder- und Sehnenapparates; Ursachen: Gicht, kleine Hautwunden, ungeeignete Aufblockeinrichtungen, Unfall, Kampf ; prophylaktisch: genügend Bewegung, Übergewicht vermeiden, Aufblockeinrichtungen prüfen, Wundbehandlung und Selbstverletzung vermeiden

2.88 Wie entstehen dicke Hände!

Antwort: Gicht, kleine Hautwunden, ungeeignete Aufblockeinrichtungen, Unfall, Kampf

2.89 Wie vermeiden Sie Aspergillose? Vorbeugemaßnahmen?

Antwort: Da Faktorenerkrankung – Stress vermeiden, immer wieder auf Parasiten untersuchen und ggf. behandeln. Auf Ernährung, Klima, Transporte, Besitzer- und Standortwechsel und psychische Stabilität achten. Besonders gefährdet sind nordische Vögel (Falken, Merlin, Pinguine,...)

2.90 Was tun Sie, wenn der Habicht von der Faust springt und kopfüber hängt?

Antwort: Ihm eine Hilfestellung geben zum Aufschwingen, bevor er das nicht selbstständig gelernt hat, darf er nicht aufs hohe Reck gesetzt werden.

2.91 Was könnten Sie tun, wenn er immer unruhig von der Faust springt?

Antwort: Verhauben und in ruhiger Umgebung üben, üben, **üben weitere Infos?**

2.92 Wie sieht der Boden der Voliere aus? Mauserkammer/Zuchtkammer

Antwort: Für die Mauserkammer empfiehlt sich ein höherer Grasbewuchs, so muss man den Boden nicht während der Mauser putzen. Die Atzung liegt nicht im Schmelz und wird dann den Jungen wieder verfüttert. Im hohen Gras verschwindet die heruntergefallene Atzung.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

2.93 Wie ist eine Habichtsnest für die Zucht herzurichten?

Antwort: **Horst des Habichts:**

Fingerdicke Äste, die stabil im Korb verflochten sind, feinere trockene Äste in der Mitte des Horstes, oft aus Lärche. In der Horstmitte befindet sich eine Mulde. So in etwa sollte auch ein Kusthorst aussehen. Wichtig, nicht in die direkte Sonne stellen – Austrocknungsgefahr!

Allgemein: sicher tragendes Untergestell

Fest verankert

Horstkorb muss auf dem Gestell befestigt sein

2.94 Woran erkennt man, wann der Greifvogel trocken ist?

Antwort: Ein Greifvogel ist trocken, wenn das Gefieder vollständig ausgewachsen ist und die Kiele des Großgefieders verhärtet sind. (Keine Blutkiele mehr)

2.95 Wann ist ein Habicht trocken?

Antwort: Habicht mit circa 8 Wochen

Falken 6-8 Wochen

Bussarde 8 Wochen

Adler 10-12 Wochen

**2.96 Wie sieht der junge Habicht aus, wenn man ihn beim Züchter abholt?
Entwicklungszustand?**

Antwort: Frühestens im Alter von drei Wochen darf ein Habicht ausgehorstet werden, wie alt der Vogel ist, kann dem Status des Gefieders entnommen werden. Mit drei Wochen: Pennen 3-4cm, Kleingefieder an der Brust und dem Rücken zwischen dem weißen Dunenkleid sichtbar.

2.97 Was bedeutet es, wenn der Schmelz grünlich ist?

Antwort: Hungerkot oder Erkrankung mit Leber- und Nierenbeteiligung

2.98 Wie oft füttern Sie einen Habichtsnestling?

Antwort: 3-4 mal am Tag

2.99 Wie halten Sie es beim jungen Habicht mit dem Gewölle?

Antwort: Gewölle bildende Stoffe erst bei der letzten Atzung des Tages geben.

Weitere Infos?

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

----- 2024 -----

2.100 Falknerknoten zeigen?

Antwort: machen!

2.101 Wie kann die Belüftung in einer Transportbox außer den üblichen lichtdichten Schlitz noch gemacht werden?

Antwort: mit einem Ventilator der im Boden eingebaut ist und die Luft absaugt damit keine vom Schmelz verunreinigte Luft an die Atmungsorgane gelangen – Gefahr einer Aspergillose.

2.102 Was macht man mit gewässertem Fleisch und wie stellt man es her?

Antwort: Es wird gefüttert um einen zu hohen Vogel tiefer zu bekommen. Daumendicke Streifen vom Rindfleisch werden in kaltes Wasser gelegt und über Nacht, also etwa 12 Stunden, im Kühlschrank aufbewahrt. Vor dem Atzen auf Körpertemperatur erwärmen.

2.103 Welche meldepflichtigen Krankheiten kennen Sie?

Antwort:

2.104 Welche anzeigepflichtigen Krankheiten kennen Sie?

Antwort:

2.105 Du bekommst 5 Tauben geschenkt, was machst Du?

Antwort: Geber auf Krankheiten hinterfragen, mindestens 14 Tage bei mind. Minus 18 Grad Celsius einfrieren, vor dem Verfüttern auftauen, zubereiten (!) und auf Körpertemperatur erwärmen.

3. Ausübung Beizjagd:

3.1 Was mache ich mit meinen BV vor der Jagd?

Antwort: Wiegen

3.2 Beizvogelappell Schritte

Antwort:

1. Tragen üben (circa 2 Wochen, anfangs mit Haube später ohne)
2. Fliegen an Lockschnur
 - Fliegen an Lockschnur (Vogel an Flugleine angebunden bis 50m Entfernung – Flugleine immer an einem Gegenstand befestigen, damit leicht abgefedert) versuchen Vogel auf die Faust/Federspiel zu locken
3. Beuteattrappe (Federspiel bzw. Balg) (tauschen mit Fleisch)
 - Federspiel zeigen, darauf atzen lassen
 - Vogel sollte Federspiel auf circa 40-50 m anfliegen mit Flugleine, bevor Frei Flug
 - Dann mal wegziehen, wenn Vogel im Anflug, dann sollte er Ring holen und erneut anfliegen
 - Falke: Durchgänge erhöhen
 - Habicht/Harris: nur einmal wegziehen, Vogel wendet, dann schlagen lassen
4. Ausbildung zur Jagd
 - Falke
 - o Faustvogel
 - o (Kompaniejagd)
 - o Anwarter (mit Hund) (Wichtig!! Keine Durchgänge fliegen lassen)
 - Habicht/Harris
 - o Faustvogel
 - o Kompaniejagd (müssen sich von klein auf kennen)
 - o Freie Folge (mit Hund)(Vogel auf Faust locken, dann Faust wegziehen und hoffen, dass er sich abstellt)

Wichtig!! Sobald der BV seine Beuteattrappe kennt und zielsicher bejagt ist es wichtig ihn sofort an Wild zu bringen!

Zu seiner ersten Beute – Taufe – bekommt r dann offiziell seinen Namen

3.3 Wie schaut Jagd mit Anwarter auf Rebhuhn aus?

Antwort:

- Anwarter immer mit Hund – brauchbarer Vorstehhund mit BV vertraut!!
- Bester Anwarter – Wanderfalke (schnellster im Sturzflug) aber auch alle anderen Herofalken
- Nicht zu warm, leichter Wind ist gut

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Ablauf:

- *Hund sucht gegen Wind*
- *Bei Witterung – Vorstehen*
- *Falkner nimmt Haube ab und hält BV hoch*
- *Vogel orientiert sich, schmelzt, schüttelt und fliegt ab*
- *Rebhuhn sieht fliegenden Falken - drücken sich*
- *Falke holt Ring und stellt sich 80-100 m über Hund*
- *Signal an Hund zum Einspringen*
- *Wild geht hoch*
- *Hat Falke Huhn geschlagen, aufnehmen und verhauben*
- *Flug erfolglos – mit Federspiel einholen*

3.4 Welche Vorstehhunde gibt es?

Antwort:

- *Deutsch Drahthaar*
- *Deutsch Kurzhaar*
- *Deutsch Stichelhaar*
- *Deutsch Langhaar*
- *Griffon*
- *Wachtelhund*
- *Großer und kleiner Münsterländer*
- *Weimaraner*
- *Spinone Italiano*
- *Pudelpointer*
- *Ungarischer Vorstehhund*

3.5 Jagdkollege hat einen Vorstehhund – Kann ich diesen für BJ nutzen? Warum nicht?

Antwort: Nein, weil der Hund und der BV sind von Anfang an kennen sollten, am besten zusammen aufgewachsen sein sollen. Der Hund muss gleichzeitig brauchbar und über absoluten Gehorsam verfügen, was auch nicht bei jedem Vorstehhund gewährleistet ist. Sollte der Hund den BV nicht kennen, besteht die Gefahr, dass sich Hund oder BV verletzen. Der Hund muss zudem sicher vorstehen und weiträumig und sicher suchen.

3.6 Wie kann ich Kondition kontrollieren? → Waage

Antwort: Gewicht kontrollieren – wenige Gramm können bereits entscheidend sein.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

3.7 Habicht auf Hasenjagd

Antwort:

Zwei Möglichkeiten _ von der Faust _ oder _ aus freier Folge

Von der Faust:

- Vogel auf Faust mit Haube
- (bei Gemeinschaftsjagd) Reihenfolge festlegen
- Durchstreifen der Äcker und Deckungen der Hasen
- Wenn Hase aufsteht, Vogel enthauben und frei geben
- Habicht hat Hasen geschlagen – Falkner muss sich schnell nähern evtl Beute halten/abfangen
- (Wichtig bei Geschmeinschaftsbeize) Hasen und BV mit Körper abdecken
- Vogel beruhigen lassen, mit Atzung aufnehmen, sichern, Beute verstauen

Aus freier Folge:

- Alleinige Jagd, entsprechendes Gelände (Wald/lockerer Baumbestand)
- Habicht kann Beute früher erkennen und Erfolgchancen größer
- Vogel steht im Baum
- Wild wird hoch gemacht
- Vogel schlägt Wild
- Falkner hin, evtl. abfangen, auf Faust nehmen, sichern, Beute verstauen

3.8 Gemeinschaftsbeizjagd Regeln

Antwort:

- Immer nur ein Vogel fliegt
- Sobald Vogel frei, bleiben die Falkner stehen und warten bis BV wieder auf Faust, gesichert und Beute verstaut/versorgt – nur eigener Falkner läuft hin
- Bei Fehlflug kein Nachwerfen eines anderen Vogels auf das gleich Stück
- Einsatz von Vogelhunden

Ablauf:

- Kontrolle der Papiere des Falkners (gültiger Falknerjagdschein auf eigenen Namen)
- Kontrolle der Papiere des Vogels (EU-Bescheinigung/CITES/Herkunftsnachweis)
- Zustand des Vogels (Gesundheit, Gefieder,...)
- Ansage, welches Wild und wie viel gebeizt werden darf
- Reihenfolge, in der geflogen wird

3.9 Wann verstoßt sich mein Vogel? → Mittagszeit/ schweimen

Antwort:

- zum Beispiel zur Mittagszeit durch Schweimen
- fehlende Motivation, Stresssituation, Wetter, falsche Gewichtskondition

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

3.10 Habicht fangt Katze, als ich hin komme läuft Katze weg, wie reagiere ich? →
Katze ist egal, weil wenn sie Habicht kratzt, kann dieser sterben – also um Vogel kümmern

Antwort:

Vogel versorgen Reicht das?

3.11 Wie funktioniert ein Falknermesser? Was mach ich damit?

Antwort: Abtun des Beutewildes

Ein vorne spitzes und geschliffenes Messer mit einer Kerbe nach circa 1/3 Länge – hinten ist die Klinge stumpf

3.12 Habicht auf Entenjagd - was brauche ich unbedingt? → wassertauglicher Hund

Antwort:

- *Enten befinden sich auf dem Wasser*
- *Entweder Habicht freie Folge und stellt sich im Baum ab oder auf Faust*
- *Falkner mit Hund nähern sich dem Gewässer*
- *Hund wird geschnallt, Enten zu heben*
- *Habicht schlägt Ente*
- *Falkner hin, abfangen, aufnehmen, sichern, versorgen*
- *Wenn im Wasser – Badehose oder Wenn nur Beute im Wasser – Hund apportiert*

3.13 Habicht fangt nach dem 10. Versuch keine Ente- wie kann ich ihn weiterhin motivieren? → Balg/ Federspiel geben, damit er ein Erfolgserlebnis hat

Antwort:

Mit einem Federspiel motivieren, dass ich ihn mal schlagen lasse

3.14 Vogel war lange Zeit krank – wie kann ich ihn für BI vorbereiten ?

Trainingsmethode Vertical Jumping

Antwort:

Über Trainingsmethoden, wie Vertical Jumping oder Drachentraining/Training mit einer Drohne

3.15 Welchen Vogel würden Sie sich aufstellen?

Antwort:

Freie Wahl

3.16 Welche Jagdarten mit dem Habicht?

Antwort:

- *Von der Faust*
- *Aus der Freien Folge*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

3.17 Welches Beizwild beim Habicht?

Antwort: universell einsetzbar, auf Haarwild, als auch Nutzwild

- *Haarwild: Hase, Kaninchen*
- *Federwild: Wildente, Fasan, Rebhuhn, Krähen*

3.18 Wie trainiert man den Habicht für die Jagd?

Antwort: Vertical Jumping – senkrechtes Springen – alte indische Trainingsmethode

„Vogel soll möglichst senkrecht, möglichst oft und möglichst schnell hintereinander auf die hoch erhobene Faust springen.“

3.19 Zwei Voraussetzungen für Jagderfolg?

Antwort: Kondition und Motivation

3.20 Woran kann man erkennen, dass Jagdkondition erreicht ist?

Antwort: körperliche Verfassung eines BVs in Bezug auf eine zu erbringende Leistung.

- **Gesundheitszustand**
- **Ernährungszustand**
- **Haltungszustand**
- **Trainingszustand**
- *(Klimatische Umweltbedingungen)*

3.21 Woran erkennt man dass der Habicht in Jagdkondition und motiviert ist (Ausdruck beschreiben)?

Antwort:

Kondition – nötige körperliche Verfassung

Ist die körperliche Verfassung eines BV in Bezug auf eine zu erbringende Leistung. Da bei einem BV vor allem das Jagdvermögen die zu erbringende Leistung darstellt, ist, mit anderen Worten, die Jagdkondition eines BV dessen zur Beizjagd notwendige körperliche Verfassung.

- **Gesundheitszustand**
- **Ernährungszustand**
- **Haltungszustand**
- **Trainingszustand**
- *(Klimatische Umweltbedingungen)*

Motivation – nötige mentale/psychische Verfassung

Ist, bezogen auf die Falknerei, die Bereitschaft eines BVs zur Jagdausübung, oder mit anderen Worten, dessen Beutebereitschaft. Die Motivation ist damit neben der Kondition die zweite maßgebliche Determinante der jagdlichen Leistungsfähigkeit eines BVs.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

3.22 Was ist wenn der Habicht zwitschert?

Antwort: dann fühlt er sich unwohl und/oder ist gestresst

3.23 Krähenbeize. Wie nähert man sich am besten? Wenn mit dem Auto, wie nah muss man ran mit einem Habicht?

Antwort

3.24 Der Habicht dreht vor den Krähen ab und stellt sich in einem Baum ab. Was können die Gründe sein?

Antwort: Motivation oder Kondition sind nicht ausreichend. Weitere Infos?

3.25 Was kann man tun um den Habicht am nächsten Vormittag auf eine Jagd am Nachmittag vorzubereiten?

Antwort: Lüften und nicht voll aufatzen, dass er am nächsten Morgen sein optimales Jagdgewicht hat Infos?

3.26 Wenn Motivation nicht ausreichend bist bzw. Jagderfolg ausbleibt, was kann man tun? (Auf Krähe aufatzen)

Antwort

3.27 Der Habicht hat eine Krähe geschlagen - Vorgehen?

Antwort: Der Habicht wird beginnen die Krähe zu Rupfen und dann mit Atzen beginnen. Der Habicht zieht seine Beute beim Rupfen immer ein Stück/etwas weiter. Vogel abreagieren lassen und dann mit blanken Fleisch auf Faust holen, sichern und Beute hinter sich verstecken/versorgen.

3.28 Wie fängt man eine Krähe ab?

Antwort

3.29 Wenn es ist die erste Beute des Habichts ist, was tut man?

Antwort: Ihn atzen lassen, bis er vollgeatzt ist und den Vogel offiziell Taufen, sprich seinen Namen geben.

3.30 Wann kann ich mit meiner aufgeatzten Beizvogel wieder jagen?

Antwort: Je nach Atzung (Tauben hält sehr lange her), bis der Vogel sein Gewölle erbracht hat und wieder Jagdgewicht hat.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

3.31 Jagdarten allgemein, danach speziell mit Habicht

(hatten vorher gefragt für welche Art man sich perspektivisch interessieren würde), gestolpert bin ich hier nur über die **Nichtverwendung der Haube beim Habicht** (das hatte ich bei euch überhört)

Antwort:

Habicht:

- *Von der Faust*
- *Aus der freien Folge*

Falke:

- *Anwarter (Wanderfalke)*
- *Von der Faust (Gerfalke)*

3.32 Es wurden zwei schlechte Skizzen von Gelände mit zwei Stromleitungen vorgelegt und gefragt welche wohl gefährlicher für den Habicht sein könnte.

Die Leitungen waren gleichgroß gezeichnet, die eine stellte eine Hochspannungsleitung, die andere eine Normalspannungsleitung dar. Hatte erst nicht kapiert was da der Unterschied sein soll. Die Normalspannungsleitung ist in der Regel niedriger und es besteht eine größere Stromschlaggefahr.

Antwort:

Gefährdungen von Greifvögeln:

- *Vogelschlag*
- *Stromtod*
- *Verkehr*
- *Massaker durch Zug*
- *Fällen von Horstbäumen*
- *Industriechemikalien*
- *Pestizide*
- *Pharmazeutika*
- *Tötung durch Fallen/Abschuss*

3.33 Dann wurde noch die Kaninchenbeize in diesem Gelände mit Stromleitung mit allen Basics abgefragt. (von oben übernommen – mit Habicht)

Antwort:

- *Vogel auf Faust des Falkners*
 - *Frettchen in Bau einschleifen (mit Bell, kein Beißring und kein Maulkorb! Nebenröhren werden nicht verschlossen)*
 - *Springt Kaninchen – Falkner gibt Vogel frei*
 - *Habicht hat Kaninchen – Falkner nähert sich schnell – abfangen/halten*
 - *BV beruhigen lassen, mit Atzung aufnehmen, sichern und Beute versorgen*
- Wichtig immer Rundumblick bewahren!*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

3.34 Welchen BV wollen sie sich aufstellen und warum > Entscheidung für Habicht wg reinem Waldrevier

Antwort:
Freie Wahl

3.35 Was können Sie tun, wenn der Habicht „sauer“ geflogen ist?

-> Begriff war nicht bekannt auf Nachfrage: Gemeint war, dass der Vogel unmotiviert ist aufgrund Erfolglosigkeit.

-> Erfolgserlebnisse verschaffen (leichte Beute, Balg mit Atzung)

Antwort: Vogel ein Erfolgserlebnis schaffen mit leichterem Beute, Federspiel/Balg mit Atzung ...

3.36 Beschreiben sie die freie Folge bzw. Beschreibung Krähenjagd mit Habicht oder Falke

Antwort:

Freie Folge mit Habicht:

- *Habicht abstreichen lassen – Gelände muss passen – Bäume*
- *Habicht folgt Falkner und Hund*
- *Hund steht vor, macht z.b. Ente/Fasan hoch*
- *Habicht schlägt*
- *Hund ablegen, hin eilen, abfangen, beruhigen lassen, aufnehmen, sichern, versorgen*

Krähenjagd Habicht:

- *Man fährt mit dem Auto und sucht Krähen – BV Beifahrersitz – verhaubt*
- *Man hält an, steigt aus und macht Habicht frei*
- *Oder: man ist Beifahrer und gibt Habicht aus Auto bei circa 50-60 km/h frei*
- *Habicht schlägt*
- *Hineilen, abfange, beruhigen lassen, aufnehmen, sichern, Beute versorgen*

Krähenjagd mit Falke:

- *Falke abstreichen lassen bevor man direkt bei den Krähen ist*
- *Falke stellt sich über Falkner ein*
- *Krähen drücken sich in Deckung z.b. Bäume*
- *Falkner mit Ratsche – Krähen fliegen auf*
- *Falke schlägt*
- *Hineilen, abfange, beruhigen lassen, aufnehmen, sichern, Beute versorgen*

3.37 Beschreiben Entenjagd mit Falken

Antwort:

Mit Hund als Anwarter jagen

- *Falke streicht ab – gutes Stück vor Gewässer*
- *Falkner und Hund nähern sich dem Gewässer*
- *Falke stellt sich über Hund und Falkner 80-100m ein*
- *Hund wird geschnallt – macht Enten hoch*
- *Falke schlägt*
- *Hineilen, abfange, beruhigen lassen, aufnehmen, sichern, Beute versorgen*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

3.38 Rothabicht schlägt Kaninchen.

Es ist seine erste Beute, was machen Sie?

Versorgung des Kaninchens - was, wie?

Antwort: Taufe des BVs

Kaninchen versorgen – ggf. abfangen

Aufbrechen und kühlen; beim Aufbrechen bereits auf Krankheitsanzeichen achten

3.39 Was ist nach dem Abfangen zu beachten?

Antwort: zügiges Aufbrechen und Kühlen des Wildbrets

3.40 Sie jagen mit dem Habicht auf Industriegelände, was ist zu beachten?

Antwort: Es bedarf einer Genehmigung zur Beizjagd auf Gelände, auf dem die Jagd normalerweise ruht. Mögliche Gefahrenquellen für den BV anschauen und bewerten. Weitere Infos?

3.41 Kaninchenjagd am Bau mit Frettchen: Wie gehen sie vor?

-> Verstopfen aller Rohren bis auf eine, war ein KO-Kriterium)

Ebenso kritisch wurden Maulkorb bzw. Beißring gesehen, da es nach Ansicht der Prüfer gegen das Tierschutzgesetz verstößt bzgl. Frettchen und Kaninchen

Antwort:

- *Vogel auf Faust des Falkners*
 - *Frettchen in Bau einschleifen (mit Bell, kein Beißring und kein Maulkorb! Nebenröhren werden nicht verschlossen)*
 - *Springt Kaninchen – Falkner gibt Vogel frei*
 - *Habicht hat Kaninchen – Falkner nähert sich schnell – abfangen/halten*
 - *BV beruhigen lassen, mit Atzung aufnehmen, sichern und Beute versorgen*
- Wichtig immer Rundumblick bewahren!*

3.42 Jagd mit Falken: welche Jagdarten (Anwarten, Faust) auf welches Wild und warum, Beutetiere,

Antwort:

- *Anwarten (Rebhuhn, Fasan, Enten) – Wanderfalke*
- *Faustfalke (Krähen, Fasan, Hasen) – Gerfalke*

3.43 Jagd mit Habicht: welche Jagdarten, Beutetiere

Antwort:

- *Von der Faust*
- *Aus der Freien Folge*
- *Beute: Hase, Kaninchen, Ente, Fasan, Rebhuhn, Krähen*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

3.43 Krähenjagd: mit welchem Vogel und wie.

Antwort:

- Mit einem Wanderfalke aus dem Auto heraus als Beifahrer
- Schnellster im Sturz/Stoßflug
- Wanderfalke schlägt nicht in Deckung – deshalb Krähen heraus drücken mit Klatschen oder Ratschen

3.46 Motivierung des Vogels auf bestimmte Beutetiere.

Antwort: Auf Beutetieren und Balg/Federspiel atzen lassen.

3.46 Kaninchenjagd: mit welchem Vogel wie in der Praxis (Bild mit Hohlweg, rechts und links Kaninchenbaue in unmittelbarer Nähe Hochspannungsleitung!)

Antwort:

- Habicht von der Faust, wegen Hochspannungsleitung

3.47 Wie verhalte ich mich wenn Vogel Beute gebunden hat und warum.

Antwort: sich langsam von vorne nähern und in der Nähe bleiben, damit kein wilder greifvogel kommt und meinem die Beute abnehmen will. Dann den BV sich abreagieren lassen und mit Fleisch auf die Faust locken und sofort sichern. Dann Beute verstecken.

3.48 Einfluss Wetter und Tageszeiten auf Beizjagd

Antwort:

Falke jagt mit dem Wind

Habichtsartige werden oftmals verblasen bei zu starkem Wind

3.49 Schweimen, beschreiben und warum

Antwort: schweimen ist das genüssliche Fliegen mit der Thermik, hierbei machen sie schnell Höhe und verstoßen sich.

Ursachen: Vogel zu wenig gelüftet, Mittagsthermik, weiteres?

3.50 ballieren

Antwort: Ballieren ist das Schwingenpeitschen des Falken auf dem Reck, auf der Jule oder auf der Faust. Das Ballieren des Falken auf der Jule ohne häufiges Abspringen ist ein Zeichen von Flug- und Jagdlust bzw. Gesundheit und Wohlbefinden.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

3.51 blaujagen

Antwort BV fliegt ein paar Angriffe auf zu großes Wild, lässt dann ab und fliegt ab in eine andere Richtung, in der er kleineres, leichter zu erlegendes Wild vermutet.

3.52 Mit welchen Vögeln ist eine Kompaniejagd möglich und warum

Antwort: hauptsächlich Harris Hawk, weil sie auch von Natur aus im Familienverbund in Kompanie jagend. Wichtig ist, dass sich die Vögel von Anfang an kennen und auf dem gleichen Federspiel/Balg atzen.

3.53 Ablauf der Kaninchenbeizjagd

Antwort:

- Vogel auf Faust des Falkners
 - Frettchen in Bau einschleifen (**mit Bell, kein Beißring und kein Maulkorb! Nebenröhren werden nicht verschlossen**)
 - Springt Kaninchen – Falkner gibt Vogel frei
 - Habicht hat Kaninchen – Falkner nähert sich schnell – abfangen/halten
 - BV beruhigen lassen, mit Atzung aufnehmen, sichern und Beute versorgen
- Wichtig immer Rundumblick bewahren!

3.54 Regeln der Gemeinschaftsbeizjagd

Antwort:

- Immer nur ein Vogel fliegt
- Sobald Vogel frei, bleiben die Falkner stehen und warten bis BV wieder auf Faust, gesichert und Beute verstaubt/versorgt – nur eigener Falkner läuft hin
- Bei Fehlflug kein Nachwerfen eines anderen Vogels auf das gleich Stück
- Einsatz von Vogelhunden

Ablauf:

- Kontrolle der Papiere des Falkners (gültiger Falknerjagdschein auf eigenen Namen)
- Kontrolle der Papiere des Vogels (EU-Bescheinigung/CITES/Herkunftsnachweis)
- Zustand des Vogels (Gesundheit, Gefieder,...)
- Ansage, welches Wild und wie viel gebeizt werden darf
- Reihenfolge, in der geflogen wird

3.55 Verschiedene Trainingsmöglichkeiten für Beizvögel

Antwort: Vertical Jumping und Drohnen Training bzw. Drachentraining.

Vertical Jumping:

- „Vogel soll möglichst senkrecht und möglichst oft und möglichst schnell hintereinander auf die hoch erhobene Faust springen“
- Anfangs wird jeder Sprung belohnt
- Später unregelmäßig

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

- In 50-100 Sprüngen Tagesration an Atzung
- Wichtig: schnelle zeitliche Abfolge, nicht absolute Höhe

*Kaum zeitintensiv
Für alle BVs geeignet
Im Garten und Haus durchführbar*

Drohnen Training:

- Ungefährlicher als Drachentraining, weil keine Leine
- GPS-Funktion
- Hohe Reichweite
- Kostenpunkt 100-10000 €
- Nur Falken

*Drohnenferpilotenlizenz nötig
Haftpflichtversicherung Pflicht
Registrierung der Drohne
Mindestalter 16 Jahre
Max 120m über Grund*

Drachentraining:

- Speziell für Falken
- Vogel nach Haube abnehmen
- In kräftig dynamischem Flugstil zum Federspiel

*Hohes Gefahrenpotential
Gute Orga/Planung notwendig
Zeitintensiv*

3.56 Jagdarten mit Beizvögeln

Antwort:

- Von der Faust
- Freie Folge
- Anwarter

3.57 Von welchen zwei Faktoren ist der Jagderfolg abhängig?

Antwort: Motivation und Kondition des BV

3.58 Was ist Kondition und von was wird es beeinflusst?

Antwort:

Kondition – nötige körperliche Verfassung

Ist die körperliche Verfassung eines BV in Bezug auf eine zu erbringende Leistung. Da bei einem BV vor allem das Jagdvermögen die zu erbringende

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Leistung darstellt, ist, mit anderen Worten, die Jagdkondition eines BV dessen zur Beizjagd notwendige körperliche Verfassung.

- **Gesundheitszustand**
- **Ernährungszustand**
- **Haltungszustand**
- **Trainingszustand**
- (Klimatische Umweltbedingungen)

Motivation – nötige mentale/psychische Verfassung

Ist, bezogen auf die Falknerei, die Bereitschaft eines BVs zur Jagdausübung, oder mit anderen Worten, dessen Beutebereitschaft. Die Motivation ist damit neben der Kondition die zweite maßgebliche Determinante der jagdlichen Leistungsfähigkeit eines BVs.

3.59 Welches Verhalten des Wildes motiviert den Greifvogel?

Antwort

3.60 Was machen Sie wenn ihr Vogel nicht mehr auffindbar ist?

Antwort: Suchen, Suchanfragen im Radio, Online, Aufgeben, Polizei informieren

GPS-Ortung

Oder Winkelsuche, wenn Flugrichtung bekannt

Oder Spiralsuche, wenn Flugrichtung unbekannt

Überflug mit Telemetrie

Verständigung der Jäger und Falkner im Umfeld

3.61 Erklären Sie die Telemetriesuche

Antwort:

Eine Telemetrieanlage, Kosten von 700 € aufwärts, besteht aus einem Sender, einem Empfänger und einer Richtantenne. Der Sender strahlt Funkwellen aus, die vom Empfangsgerät über die Richtantenne in ein akustisches und optisches Signal umgewandelt werden. Anhand der Intensität des empfangenen Signals kann die Richtung bestimmt werden, in der sich der Beizvogel verfliegen hat.

Die Entfernung lässt sich nicht genau bestimmen, mit einer gewissen Übung kann man die Entfernung aber grob abschätzen. Die Reichweite der Telemetrie beträgt 5 km, bei teureren Anlagen auch erheblich mehr.

*Es gibt die **Winkelsuche** (Bildung 50 km Suchkreis und 90° Suchwinkel in wahrscheinliche Flugrichtung, Abstand der Suchpunkte nicht weiter, als 5km auseinander, Flugrichtung muss hierfür bekannt sein)*

*und die **Spiralsuche** (Flugrichtung ist unbekannt, Kreisfläche 50km, Einfügen von Peilpunkten im Abstand von 5km und Bögen maximal im Abstand von 10 km)*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Montagearten:

Die **Ständerbefestigung** ist eine häufige Befestigungsart. Der Sender wird über dem Geschüh befestigt, was der Greif wie das Anlegen des Geschühs gewöhnt ist. Es ist eine sichere Montage, die allerdings, wenn der Beizvogel mit der Beute auf dem Boden steht, das schwächste Signal im Vergleich zu anderen Montagen liefert.

Bei der **Stoßmontage** wird mit einer kleinen Metallmanschette der Sender an einer der Deckpennen befestigt. Dadurch bleiben die Hände des Beizvogels frei und das übermittelte Signal ist besser zu empfangen, wenn der Beizvogel auf dem Boden steht. Größter Nachteil ist, dass die Stoßfeder durch den Sender herausgezogen werden kann, z.B. beim Kampf des Beizvogels mit wehrhaften Wild wie Krähen. – 13-

Bei der **Rucksackmontage** wird der Sender mit einer Klammer versehen, auf dem Rücken des Beizvogels wird ein schmales Metallplättchen zwischen den Schulterblättern von zwei Teflonbänder gehalten, die vom Rücken kommend kreuzförmig über die Brust und unter den Schwingen hindurch zurück zum Metallplättchen laufen. Von Vorteil ist, die Ständer sind frei von unnötigen Ballast und der Sender ist dem Vogel bei keiner seiner Aktivitäten im Wege und durch die höhere Position als bei der Ständermontage sind die Sendeeigenschaften besser. Die Montage des Senders ist naturgemäß schwieriger und muß perfekt sitzen.

3.61 Erklären Sie den Ablauf der Beizjagd mit dem Anwarter auf Rebhuhn

Antwort:

Mit Hund als Anwarter jagen

- Falke streicht ab – gutes Stück vor Deckung
- Falkner und Hund nähern sich der Deckung
- Falke stellt sich über Hund und Falkner 80-100m ein
- Hund wird geschnallt – hat Witterung – steht vor
- Hund springt auf Kommando ein
- Falke schlägt
- Hineilen, abfange, beruhigen lassen, aufnehmen, sichern, Beute versorgen

3.62 Wie weit wirft man den Habicht maximal?

Antwort: auf Schrotschuss-Entfernung, also maximal 30 – 40m.

3.63 Erklären Sie den Ablauf der Beizjagd mit Harris Hawk auf Hasen

Antwort:

:

Zwei Möglichkeiten _ von der Faust _ oder _ aus freier Folge

Von der Faust:

- Vogel auf Faust mit Haube
- (bei Gemeinschaftsjagd) Reihenfolge festlegen – in Kompanie können auch mehrere fliegen
- Durchstreifen der Äcker und Deckungen der Hasen

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

- Wenn Hase aufsteht, Vogel enthauben und frei geben
 - Harris hat Hasen geschlagen – Falkner muss sich schnell nähern evtl Beute halten/abfangen
 - (Wichtig bei Gemeinschaftsbeize) Hasen und BV mit Körper abdecken
 - Vogel beruhigen lassen, mit Atzung aufnehmen, sichern, Beute verstauen
- Aus freier Folge:
- Alleinige Jagd, entsprechendes Gelände (Wald/lockerer Baumbestand)
 - Habicht kann Beute früher erkennen und Erfolgchancen größer
 - Vogel steht im Baum
 - Wild wird hoch gemacht
 - Vogel schlägt Wild
 - Falkner hin, evtl. abfangen, auf Faust nehmen, sichern, Beute verstauen

3.64 Erklären Sie die Kaninchenjagd mit dem Habicht

Antwort:

- Vogel auf Faust des Falkners
 - Frettchen in Bau einschleifen (**mit Bell, kein Beißring und kein Maulkorb! Nebenröhren werden nicht verschlossen**)
 - Springt Kaninchen – Falkner gibt Vogel frei
 - Habicht hat Kaninchen – Falkner nähert sich schnell – abfangen/halten
 - BV beruhigen lassen, mit Atzung aufnehmen, sichern und Beute versorgen
- Wichtig immer Rundumblick bewahren!

3.65 Was muss man bei der Jagd aus dem Auto berücksichtigen?

Antwort: Hinternisfreiheit, keine Verkehrsteilnehmer, keine Bäume, keine Masten, keine Personen, keine Büsche,

3.66 Was machen sie, wenn ihr Greifvogel in unterer Kondition ist?

Antwort:

Durch Vertical Jumping, Drachentraining oder Drohnentraining trainieren

3.67 Krähenbeize

Antwort:

Krähenjagd Habicht:

- Man fährt mit dem Auto und sucht Krähen – BV Beifahrersitz – verhaubt
- **Man hält an, steigt aus und macht Habicht frei**
- **Oder: man ist Beifahrer und gibt Habicht aus Auto bei circa 50-60 km/h frei**
- Habicht schlägt
- Hineilen, abfange, beruhigen lassen, aufnehmen, sichern, Beute versorgen

Krähenjagd mit Falke:

- Falke abstreichen lassen bevor man direkt bei den Krähen ist
- Falke stellt sich über Falkner ein
- Krähen drücken sich in Deckung z.b. Bäume

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

- Falkner mit Ratsche – Krähen fliegen auf
- Falke schlägt
- Hineilen, abfange, beruhigen lassen, aufnehmen, sichern, Beute versorgen

3.68 Freie Folge, Anwarten, Hohe Warte

Antwort

3.69 Was tun, wenn GV wegfliegt

Antwort: Suchen, Suchanfragen im Radio, Online, Aufgeben, Polizei informieren

GPS-Ortung

Oder Winkelsuche, wenn Flugrichtung bekannt

Oder Spiralsuche, wenn Flugrichtung unbekannt

Überflug mit Telemetrie

Verständigung der Jäger und Falkner im Umfeld

3.70 Gemeinschaftsbeizjagd-Ablauf, Appell,...

- Trainingsmethoden

Antwort:

Antwort:

- Immer nur ein Vogel fliegt
- Sobald Vogel frei, bleiben die Falkner stehen und warten bis BV wieder auf Faust, gesichert und Beute verstaut/versorgt – nur eigener Falkner läuft hin
- Bei Fehlflug kein Nachwerfen eines anderen Vogels auf das gleich Stück
- Einsatz von Vogelhunden

Ablauf/Apell:

- Kontrolle der Papiere des Falkners (gültiger Falknerjagdschein auf eigenen Namen)
- Kontrolle der Papiere des Vogels (EU-Bescheinigung/CITES/Herkunftsnachweis)
- Zustand des Vogels (Gesundheit, Gefieder,...)
- Ansage, welches Wild und wie viel gebeizt werden darf
- Reihenfolge, in der geflogen wird

3.71 Wie finde ich meinen Vogel wieder wenn ich ihn bei der Jagd verliere und welche Gründe gibt es dafür

Antwort:

Eine Telemetrieanlage, Kosten von 700 € aufwärts, besteht aus einem Sender, einem Empfänger und einer Richtantenne. Der Sender strahlt Funkwellen aus, die vom Empfangsgerät über die Richtantenne in ein akustisches und optisches Signal umgewandelt werden. Anhand der Intensität des empfangenen Signals kann die Richtung bestimmt werden, in der sich der Beizvogel verfolgt hat.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

Die Entfernung lässt sich nicht genau bestimmen, mit einer gewissen Übung kann man die Entfernung aber grob abschätzen. Die Reichweite der Telemetrie beträgt 5 km, bei teureren Anlagen auch erheblich mehr.

Es gibt die Winkelsuche (Bildung 50 km Suchkreis und 90° Suchwinkel, Flugrichtung muss hierfür bekannt sein) und die Spiralsuche (Flugrichtung ist unbekannt, Kreisfläche 50km, Einfügen von Peilpunkten im Abstand von 5km und Bögen maximal im Abstand von 10 km) **hier fehlen Infos?**

Gründe: z.B. Schweimen

3.72 Was ist Motivation und von was wird es beeinflusst?

Antwort:

Motivation – nötige mentale/psychische Verfassung

Ist, bezogen auf die Falknerei, die Bereitschaft eines BVs zur Jagdausübung, oder mit anderen Worten, dessen Beutebereitschaft. Die Motivation ist damit neben der Kondition die zweite maßgebliche Determinante der jagdlichen Leistungsfähigkeit eines BVs.

3.73 Wie nennt man die Vögel / Jagd bei der freien Folge und Warte?

Antwort

3.74 Welche Beizvögel nimmt man bei der Jagd vorn niederen Flug?

Antwort:

Kurzstreckenjäger= Habichtsartige

3.75 Welches Beizwild kann man in der Freien Folge bejagen?

Antwort: Hase, Enten, Fasane, Rebhuhn, Krähen (bei passendem Gelände)

3.76 Beschreiben Sie, wie die Freie Folge abläuft!

- Antwort:

- Alleinige Jagd, entsprechendes Gelände (Wald/lockerer Baumbestand)
- Habicht kann Beute früher erkennen und Erfolgschancen größer
- Vogel steht im Baum
- Wild wird hoch gemacht
- Vogel schlägt Wild
- Falkner hin, evtl. abfangen, auf Faust nehmen, sichern, Beute verstauen

3.77 Was sind die Vorteile der freien Folge?

Antwort: Habicht kann die Beute früher erkennen – höhere Erfolgschancen

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

3.78 Was sind die Nachteile der freien Folge?

Antwort: Der BV kann noch leichter Beute jagen, die er nicht jagen soll, weil er sie meist vor uns sieht

Gelände muss dazu passen – sprich lockerer Baumbestand, oder Wald

3.79 Was meint man mit Abtragen und Beizjagd mit Vögeln des Hohen Flug?

Antwort:

Langstreckenjäger = Falken – Viele Durchgänge fliegen beim Abtragen auf das Federspiel

3.80 Welche Vögel nimmt man beim hohen Flug?

Antwort: Falken

3.81 Beschreiben Sie die Jagd mit dem Anwarterfalken!

Antwort:

Mit Hund als Anwarter jagen

- *Falke streicht ab – gutes Stück vor Deckung*
- *Falkner und Hund nähern sich der Deckung*
- *Falke stellt sich über Hund und Falkner 80-100m ein*
- *Hund wird geschnallt – hat Witterung – steht vor*
- *Hund springt auf Kommando ein*
- *Falke schlägt*
- *Hineilen, abfange, beruhigen lassen, aufnehmen, sichern, Beute versorgen*

3.82 Welches Beizwild lässt sich mit dem Anwarter schlagen? Aufzählen!

Antwort: Krähen, Enten, Fasan, Rebhuhn, Tauben, Elstern, Eichelhäher, Möwen

3.83 Welche Jagdarten zählen zum Hohen Flug?

Antwort: Anwarter evtl. Faustfalke

3.84 Welche Beizvögel eignen sich zur Krähenjagd? Warum ?

Antwort: Habicht, Harris Hawk, Lanner-, Saker-, Ger- und Wanderfalke,...

3.85 Welche Gründe könnte es haben, wenn ihr Beizvogel sich verstößt?

Antwort: Stress, fehlende Motivation, Wetter, falsche Gewichtskondition, Erschrecken

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

3.86 Ihr Beizvogel hat sich verstoßen, wie finden Sie ihn wieder?

Antwort:

Antwort: Eine Telemetrieanlage, Kosten von 700 € aufwärts, besteht aus einem Sender, einem Empfänger und einer Richtantenne. Der Sender strahlt Funkwellen aus, die vom Empfangsgerät über die Richtantenne in ein akustisches und optisches Signal umgewandelt werden. Anhand der Intensität des empfangenen Signals kann die Richtung bestimmt werden, in der sich der Beizvogel verflogen hat.

Die Entfernung lässt sich nicht genau bestimmen, mit einer gewissen Übung kann man die Entfernung aber grob abschätzen. Die Reichweite der Telemetrie beträgt 5 km, bei teureren Anlagen auch erheblich mehr.

Es gibt die Winkelsuche (Bildung 50 km Suchkreis und 90° Suchwinkel, Flugrichtung muss hierfür bekannt sein) und die Spiralsuche (Flugrichtung ist unbekannt, Kreisfläche 50km, Einfügen von Peilpunkten im Abstand von 5km und Bögen maximal im Abstand von 10 km)

3.87 Welche technischen Möglichkeiten haben Sie, den verstoßenen Beizvogel wieder zu finden?

Antwort:

- *Telemetrie*
- *GPS*
- *Internet, Radio, ...*

3.88 Wie funktioniert die Suchmethode, wenn die Richtung bekannt ist?

Antwort: Es gibt die Winkelsuche (Bildung 50 km Suchkreis und 90° Suchwinkel in wahrscheinlichster Flugrichtung, Flugrichtung muss hierfür bekannt sein, Abstand der Suchpunkte nicht weiter, als 5km auseinander)

3.89 Sie empfangen ein Sendersignal, wissen also, dass der verstoßene Vogel irgendwo in der Nähe ist was für Indizien haben sie noch, den genaueren Aufenthaltsort des Beizvogels zu finden?

Antwort: Auf Anzeichen im Umfeld achten, hassende Krähen, Schreiende Eichelhäher,...

3.90 Anhand von Zeichnungen (Gelände, Bewuchs, Baume, Feld, Wind) soll die Rebhuhnbeize mit dem Anwärter und dem Hund erklärt werden.

Antwort:

- *Anwarter immer mit Hund – brauchbarer Vorstehhund mit BV vertraut!!*
- *Bester Anwarter – Wanderfalke (schnellster im Sturzflug) aber auch alle anderen Herofalken*
- *Nicht zu warm, leichter Wind ist gut*

Ablauf:

- *Hund sucht gegen Wind*
- *Bei Witterung – Vorstehen*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

- Falkner nimmt Haube ab und hält BV hoch
- Vogel orientiert sich, schmelzt, schüttelt und fliegt ab
- Rebhuhn sieht fliegenden Falken - drücken sich
- Falke holt Ring und stellt sich 80-100 m über Hund
- Signal an Hund zum Einspringen
- Wild geht hoch
- Hat Falke Huhn geschlagen, aufnehmen und verhauben
- Flug erfolglos – mit Federspiel einholen

3.91 Erklären Sie das Abstreifen über Wind?

Antwort

3.92 Wie wird das Beizwild (hier Rebhuhn) gehoben (Windrichtung)?

Antwort:

*Durch einen Hund, der Witterung bekommt und das Rebhuhn vorsteht.
Durch Kommando einspringt und das Rebhuhn hoch macht.*

3.93 Anhand von Zeichnungen (Gelände) sollen Gefahren gefunden werden. (z.B. nahegelegene Straße)

Antwort:

Gefährdungen von Greifvögeln:

- Vogelschlag
- Stromtod
- Verkehr
- Massaker durch Zug
- Fällen von Horstbäumen
- Industriechemikalien
- Pestizide
- Pharmazeutika
- Tötung durch Fallen/Abschuss

3.94 Anhand von zwei Zeichnungen jeweils mit unterschiedlichen Hochspannungsleitungen, soll die gefährlichere“ gefunden werden?

Antwort:

Gefährdungen von Greifvögeln:

- Vogelschlag
- Stromtod
- Verkehr
- Massaker durch Zug
- Fällen von Horstbäumen
- Industriechemikalien
- Pestizide
- Pharmazeutika
- Tötung durch Fallen/Abschuss

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

----- 2024 -----

- 3.95** **Pfarrer hat auf dem Friedhof ein Kaninchen-Problem, wie muss vorgegangen werden? Was machen Sie wenn dabei Ihr Habicht im benachbarten Jagdrevier einen Hasen schlägt?**

Antwort: *Pfarrer muss bei der Jagdbehörde eine schriftliche Genehmigung beantragen. Diese wird auf den Namen des Falkners ausgestellt, Begründung muss der Pfarrer liefern (z.B. schiefe Grabsteine)
Der Falkner benötigt zusätzlich eine schriftliche Erlaubnis des Grundstücks-Eigentümer.
Hase im Nachbarrevier: Hase abfangen und vorerst liegen lassen, Beizvogel versorgen und sichern, das war Wilderei, Information an den Jagdberechtigten oder, wenn nicht möglich, Polizei. Hase gehört dem Jagdberechtigten.*

- 3.96** **Wie bildet man den Greifvogel auf ein bestimmtes Wild aus?**

Antwort:

- 3.97** **Abtragen Habicht auf Hasen, was ist besonders wichtig?**

Antwort : der Kopfgriff

- 3.98** **Was ist eine Balgzugmaschine und wie funktioniert sie?**

Antwort:

- 3.99** **Was macht Wild für einen Beizvogel noch attraktiver?**

Antwort: *wenn es hinkt, klagt, humpelt oder sichtbar krank ist*

- 3.100** **Was ist ein Drachenflugtraining und wie funktioniert es?**

Antwort:

4. Recht

Recht von Daniel ist bis auf rot fertig ! nur noch die neuen Fragen ab 4.65

4.1 Darf man mit einem Sperber auf einen Graureiher beizen?

Graureiher = ca. 95cm + 1,5kg. Sperber gem. Schöneberg 37cm + 320g

→ § 4 TierschG: Ist die Tötung eines Wirbeltieres ohne Betäubung im Rahmen weidgerechter Ausübung der Jagd oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften zulässig (...) so darf die Tötung nur vorgenommen werden, wenn hierbei nicht mehr als unvermeidbare Schmerzen entstehen.

→ Das „Kaliber“ des Sperber reicht nicht, um einen Graureiher waidgerecht zu erlegen.

→ (Unter Umständen Gefährdung des Greifvogels)

4.2 Benennen Sie die 4 einheimischen Beizvogel (BV)

§3 II Nr.2 BWildSchV: Wer Greife oder Falken hält, (...) darf insgesamt nicht mehr als zwei Exemplare der Arten **Habicht**, **Sperber**, **Steinadler** und **Wanderfalke** halten

4.3 Darf man neben 2 heimischen BV noch einen Harris Hawk halten?

Wo ist das geregelt?

→ Harris ist kein heimischer Greifvogel, da nicht in Anlage 4 BWildSchV genannt + nicht in der Tabelle Anl. 6 (Kennzeichnungspflicht) genannt, daher keine Kennzeichnung notwendig (Einzelfallentscheidung ob sinnvoll)

→ §3 BWildSchV gilt demnach nicht. Bea. §7 BArtSchV

→ Mindestanforderungsgutachten an die Haltung von Greifvögeln und Eulen: „Die Haltung von Greifvögeln und Eulen erfordert Sachkunde“ -> Also Sachkundenachweis notwendig. Zudem keine Makel der Zuverlässigkeit.

→ Meldung an Untere Naturschutzbehörde

4.4 Jagd im befriedeten Bezirk:

+ wen muss man fragen (1)

+ 4 Kaninchen werden erbeutet, wem gehört die Beute? (2)

-> dem Falkner

+ Vogel schlägt im Nachbarrevier - was ist zu tun? (3)

→ (1): Man braucht eine Genehmigung der unteren Jagdbehörde sowie die Erlaubnis des Grundeigentümers

→ (2): Dem Jagdausübungsberechtigten

→ (3): Gesetzliche Wildfolge beachten! Pflichten nach dem TierSchG nachkommen (Wild erlegen/ versorgen). Vogel sichern.

Jagdausübungsberechtigten des anderen Reviers verständigen. Sofern keine andere Abmachung -> Wild liegen lassen.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

4.5 Sie gehen mit einem Wanderfalken auf die Jagd nach Schottland (Nicht-EU)

+ welche Papiere sind erforderlich und wer erteilt sie (1)

+ ihr BV verstößt sich in Schottland und sie müssen das Land zwingend sofort verlassen - was ist zu tun? (2)

-> Meldung des Verlustes nicht erst daheim" (untere Jagdbehörde), sondern bereits bei der Wiedereinfuhr.

→ (1): Kommt auf den Anhang an, in welchem sich der Vogel befindet. Aber grundsätzlich: Einfuhrgenehmigung des Drittstaates; Ausfuhrgenehmigung aus Deutschland; Anmeldung bei der Zollstelle. Für die Rückkehr umgekehrt. Wer erteilt die Genehmigungen? -> Bea. §48 I Nr.2 BNatSchG: Vollzugsbehörden im Sinne des Artikels 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 und des Artikels IX des Washingtoner Artenschutzübereinkommens sind (...) das Bundesamt für Naturschutz (...) für die Erteilung von Ein- und Ausfuhrgenehmigungen und Wiederausfuhrbescheinigungen

→ (2) Meldung (Abgang) an zuständige Behörden und Zollstellen. Sowohl im Ausland als auch im Inland -> Unverzüglich.

4.6 Aushorsten Habicht

+ was erforderlich (1)

+ ich vertrete mir den Fuß, wer darf noch Aushorsten?

-> Inhaber Falknerjagdschein

+ was mache ich als erstes, wenn ich von der-Leiter runterkomme?

-> beringen, so Ring bereits vorhanden

+ Wo bekomme ich einen Ring her?

-> Abk. genügten (ausdrücklich) (2)

→ (1): Aushorstung gem. §22 BJagdG: Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann im Einzelfall das Aushorsten von Nestlingen und Ästlingen der Habichte für Beizzwecke aus den in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2009/147/EG genannten Gründen und nach den in Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG genannten Maßgaben genehmigen.-> Schriftliche Genehmigung der unteren Jagdbehörde. Schriftliches Einverständnis des Revierinhabers. Vornahme durch Jagdscheininhaber, da Jagdhandlung (Eigentumserwerb gem. §958 BGB)

→ Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe/ Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe und Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz (ZZF/ WZF und BNA)

4.7 Sie verfüttern Eintagsküken, was ist zu beachten?

-> Genehmigung vom Veterinäramt

→ Bei aus kommerziellen Gründen getöteten Eintagsküken handelt es sich um Material der Kategorie 3 der EG-VO 1069/2009, da das Einfrieren lediglich eine Zwischenbehandlung und nicht eine Verarbeitung darstellt. Nach Artikel 16 der o.g. EG-VO ist die Fütterung von u.a. Raubvögeln mit (unverarbeitetem) Material der Kategorie 3 als Ausnahme möglich, sofern die zuständige Behörde eine Genehmigung erteilt. -> Klingt kompliziert, aber nur weil Eintagsküken dem Tierischen-Nebenproduktrecht und nicht dem Futtermittelrecht angehören.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

- 4.8 Sie fliegen eine Drohne zum Falkentraining. Was ist zu beachten?**
 -> Drohnenführerschein, max. Flughöhe ... Wo dürfen sie nicht fliegen?
 → *Kennzeichnungspflicht ab 0,25g; Kenntnissnachweis ab 2kg; Erlaubnispflicht ab 5kg; Ab 120m Flughöhe nur mit Ausnahmeerlaubnis der Landesluftfahrtbehörde. Sichtflugregeln beachten; Nicht in Flugverbotszonen. Achtung, vorstehendes ist möglicherweise überholt: neue Vorschriften!!*
- 4.9 Wie kann man an einen Habicht kommen?**
 → *Züchter/ Aushorstung/ Schadhabicht*
- 4.10 Aushorsten: Darf jemand anderer für mich aushorsten?**
 Was benötige ich zuvor - drei Dinge?
 (Genehmigung Jagdausübungsberechtigter, Genehmigung untere Jagbehörde, Ring)
S.O.
- 4.11 Woher Ring?**
*Antwort: ZZF - Zentralverband zoologischer Fachbetriebe e.V., WZF - Wirtschaftsgemeinschaft zoologischer Fachbetriebe, BNA – Bundesverband für fachgerechten Natur- Tier- und Artenschutz e.V. Achtung: Abkürzungen **sind nicht** ausreichend!*
- 4.12 Wenn Nestling am Boden ist, was ist zuerst zu tun?**
 (Ring anbringen)
S.O.
- 4.13 Darf ich einen ausgehorsteten Habicht in die Freiheit entlassen wenn ich die Falknerei aufgebe? Welche Rechtsgrundlage?**
 → *§40 BNatSchG: Von dem Erfordernis einer Genehmigung sind ausgenommen (...) das Ansiedeln von Tieren, die dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen, sofern die Art in dem betreffenden Gebiet in freier Natur in den letzten 100 Jahren vorkommt oder vorkam. Die zuständige Behörde kann anordnen, dass ungenehmigt ausgebrachte Tiere (...) beseitigt werden, soweit es zur Abwehr einer Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten erforderlich ist.*
 → *Beachte zudem TierSchG: Tier muss sich selbst ernähren können.*
- 4.14 Welche Papiere benötige ich wenn ich einer Einladung zur Beizjagd in Österreich folge?**
 → *Kein besonderes Dokument notwendig. Nachweis der legalen Herkunft kann aber jederzeit verlangt werden. CITES/ EU-Bescheinigung sinnvoll. Der Falkner sollte sich vor Reiseantritt mit den zuständigen Behörden am Zielort in Verbindung setzen. Für die Beizjagd ist ein gültiger, auf den Namen des Falkners lautender, Falknerjagdschein notwendig.*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

4.15 Welche Papiere benötige ich wenn ich eine Einladung zur Beizjagd in Schottland habe?

S.O.

4.16 Mein Beizvogel verstößt sich in Schottland und ich muss nach Deutschland zurückreisen. Was muss ich tun?

(Verlust bei Zollstelle melden, da Wiedereinfuhrbescheinigung vorhanden aber kein Vogel, anschließend Abgang bei Behörde melden)

- Kann ich zu jeder Zollstelle gehen?

→ *Es empfiehlt sich zu der Zollstelle zu gehen, die bereits Kenntnis von dem Vorgang hat*

4.17 Der Pfarrer einer Gemeinde bittet mich auf dem Friedhof Kaninchen zu beizen, wer beantragt dies wo?

→ *Der Pfarrer bei der unteren Jagdbehörde.*

4.18 Welche Angaben stehen in der Genehmigung der Behörde?

→ *Was, Wann, Wo, Wie*

4.19 Wem gehören die gebeizten Kaninchen?

→ *Gem. §6a IX BJagdG:* Das Recht zur Aneignung von Wild nach § 1 Absatz 1 Satz 1 steht in den Fällen der nach Absatz 5 behördlich angeordneten Jagd und der Wildfolge nach Absatz 8 dem Jagd ausübungsberechtigten des Jagdbezirks oder dem beauftragten Jäger zu.

4.20 Darf ich mir einen Ger x Lannerfalken kaufen?

→ *Das Hybridisierungsverbot gem. §8ff. BArtSchV betrifft nur Greifvögel, die genetische Anteile von mindestens einer heimischen Greifvogelart enthalten.*

→ *Weder Ger noch Lanner sind in der Anlage 4 BWildSchV genannt, weswegen sie nicht heimisch sind*

→ *(Auch nicht im LANA-Protokoll genannt)*

→ *Ja, ich darf mir einen Ger x Lanner kaufen. Sofern der Vogel legal ist und ich alle weiteren rechtlichen Voraussetzungen erfülle*

4.21 Darf ich einen Ger x Lannerfalken verkaufen?

→ *Das Hybridisierungsverbot gem. §8ff. BArtSchV betrifft nur Greifvögel, die genetische Anteile von mindestens einer heimischen Greifvogelart enthalten.*

→ *Weder Ger noch Lanner sind in der Anlage 4 BWildSchV genannt, weswegen sie nicht heimisch sind*

→ *(Auch nicht im LANA-Protokoll genannt)*

→ *Ja, ich darf einen Ger x Lanner verkaufen. Sofern der Vogel legal ist und ich alle weiteren rechtlichen Voraussetzungen erfülle*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

- 4.22 Darf ich mit meinem Habicht Graureiher beizen (haben Jagdzeit)?**
Grundlagen, Jagdrecht,
S.O.
- 4.23 heimische/ nichtheimische Schritte nach Anschaffung (1) Jagd im befriedeten Bezirk (2) Vogel schlägt in Nachbarrevier was nun? (3)**
(1) *Meldung an die zuständige Behörde (UJB bei heimischen/ UNB bei nichtheimischen) Bei Neubegründung 4 Wochen/ Bestandserweiterung unverzüglich*
(2) S.O.
(3) S.O.
- 4.24 Greifvogel mit blauem Ring zu verschenken - nehme ich den?**
Hybride, Haltungsverbot (Ich hatte, Gott sei gedankt, von den Prüflingen Gestern von der Frage gehört und hab's nachgeplappert) Hatte danach im Internet recherchiert und konnte dazu nichts finden! Habe nur finden können das Beringungsstationen eine Farbcodierung für die Länderkennung verwenden etc.)
→ *Nein, da es ein Haltungsverbot für Greifvogelhybriden gibt gem. §10 BArtSchV*
- 4.25 Kauf eines Gerfalken in Kanada, welche Papiere und woher bekomme ich die, wo geregelt. (1)**
- Kennzeichnungspflicht wo geregelt was muss ich tun. (2)
(1) *Einfuhrgenehmigung vom Bundesamt für Naturschutz; vorher die erforderlichen CITES-Dokumente beantragen (Cites Bescheinigung – jetzt beantragen! (bfn.de)) Geregelt in der EG-VO 338/97 und 865/2006 (Art. 2 Buchst. d; Art 4 I; Art. 7 I EG-VO 338/97)*
- 4.26 Aushorstung Habicht: Vorgehen, Maßnahmen, Meldung an wen? (1)**
- Vorlagebescheinigung: wo geregelt und für was (2)
→ *Jede Bescheinigung zur Vorlage bei einem Amt.*
- 4.27 Züchter bietet Falken mit blauem Ring an**
→ *Darf er nicht. Es sei denn er verkauft ausschließlich ins Ausland. Blauer Ring = Hybrid. (Haltung wäre OWi gemäß § 69 III BNatSchG i.V.m §16 II Nr. 7 BArtSchV)*
- 4.28 Anmeldung von heimischen und nichtheimischen Greifen, wo, Fristen?**
S.O.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

4.29 rechtliche Voraussetzungen für die Ausübung der Beizjagd

- ➔ *Bea. §15 I BJagdG*: Wer die Jagd mit Greifen oder Falken (Beizjagd) ausüben will, muß einen auf seinen Namen lautenden Falknerjagdschein mit sich führen.
 - + *Legalen und geeigneten Greifvogel*
 - + *Jagdrevier*

4.30 Aushorstung Habicht

Schadhabicht

S.O.

4.31 Was wird in der Bundeswildschutzverordnung geregelt?

- ➔ *Heimische Greifvögel; Haltung; Bestandsanzeige*

4.32 Was wird in der Bundesartenschutzverordnung geregelt?

- ➔ *Besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten. Haltungs- und Zuchtverbote. Kennzeichnungspflicht. Hybridisierung. Nichtheimische Greifvögel*

4.33 Meldezeiten von heimisch und nicht einheimischen Greifvögeln

- ➔ *Neubegründung 4 Wochen; Bestandserweiterung unverzüglich*

4.34 Dürfen sie einen Hybriden aus Gerfalke und Lannerfalke aus Österreich importieren?

S.O.

4.35 Was machen sie wenn sie diesen importiert haben?

- ➔ *Meldung an die zuständige Behörde -> UNB*

4.36 Was regelt das Bundesnaturschutzgesetz?

- ➔ *Überführung des WAÜ + EG-VO ins deutsche Recht. Besonders und Streng geschützte Arten. „Dach über BArtSchV und BWildSchV“. Bea. §46 f. BNatSchG -> Nachweispflicht über rechtmäßigen Besitz und die Beschlagnahme*

4.37 Erklären sie das Vermarktungs- und Besitzverbot

- ➔ *Die Vermarktung (Kauf, Verkauf, zur Schau stellen) von allen Anhang A der EG-VO 338/97 ist grundsätzlich verboten -> Naturentnahmen*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

➔ *Besitzverbot: Ich würde mir die Frage grundsätzlich konkretisieren lassen! Ansonsten unterliegen Greifvögel und Eulen keinem Besitzverbot, wenn sie legal in die EU eingeführt, sie gezüchtet oder legal aus der Natur entnommen worden sind. Der Nachweis hierüber ist vom Halter zu führen. (Hilfestellung: <https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-03/Faltblatt%20Informationen%20f%C3%BCr%20Eulen%20und%20Greifv%C3%B6gel%202021.pdf> / Gesetzliche Grundlagen | EDGAR (greifvogelverfolgung.de))*

4.38 Was müssen sie rechtlich beachten, wenn sie einen Habicht aushorsten wollen?

S.O.

4.39 Was brauchen sie, wenn sie in einem befriedeten Bezirk beizen möchten? Auf wen gehen sie zu?

S.O.

4.40 Welche drei Dinge müssen in der Genehmigung des Landratsamtes stehen, wenn sie in einem befriedeten Bezirk beizen möchte?

S.O.

4.41 Dürfen sie Küken einfach verfüttern? An wen müssen sie sich wenden?

S.O.

4.42 Was machen sie, wenn ihr Vogel sich verstoßen hat? Wer haftet, wenn ihr verstoßener Habicht die Gans des Bauern schlägt?

➔ *Nicht die Verfolgung aufgeben, da sonst das Eigentum verloren geht. Solange Eigentum vorhanden, haftet der Besitzer.*

4.43 Was tun sie, wenn ihr Vogel in einem fremden Revier einen Hasen geschlagen hat?

S.O.

4.44 Voraussetzungen zur Erteilung eines Falknerjagdscheines

Die erste Erteilung eines Falknerjagdscheines ist davon abhängig, dass der Bewerber zusätzlich zur vereinfachten Jägerprüfung (ohne Schießprüfung) eine Falknerprüfung bestanden hat (§15 BJagdG). Er muss darin ausreichende Kenntnisse des Haltens, der Pflege und des Abtragens von Beizvögeln, des Greifvogelschutzes sowie der Beizjagd nachweisen. Er braucht eine Jagdhaftpflicht über die beantragte Laufzeit, 50.000 für Sachschäden, 500.000 für Personenschäden.

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

- 4.45 Erwerb von heimischen Beizvögeln und „Exoten“**
Meldefristen, wie viele von welchen Arten, relevante Gesetzesgrundlagen
S.O.
- 4.46 Unterschiede bei Greifvogelerwerb vom Züchter (EU-nicht EU)/ durch Aushorsten**
- erforderliche Papiere?
S.O.
- 4.47 Welche Gesetzesgrundlagen bei Aushorsten zu beachten Besonderheiten bei Schadhabichten**
(Stichwort obligater Fallenlehrgang)
S.O.
- 4.48 Haltung des Greifvogels wo geregelt?**
Wildgehege / Tiergehege?
S.O.
- 4.49 Volieren**
→ Mindestmaße (Grundfläche m² / Raumvolumen m³), für welchen Vogel welche Größe erforderlich?
S.O.
- 4.50 Besonderheiten der Baugenehmigung innerorts / außerorts**
(ab wieviel m besteht Pflicht zur Einholung einer Genehmigung?)
Anlage im Außenbereich oder Innenbereich mit mehr als 75m³
- 4.51 Voliere außerhalb geschlossener Ortschaften → worauf ist zu achten?**
Antwort: ???????
- 4.52 Beringung - wo geregelt?**
§12 i.V.m. Anlage 6 BArtSchV
- 4.53 Wo sind Ringe erhältlich? Beringung Zuchtvogel / ausgehorsteter Vogel (1)? Alternative Markierungsmöglichkeiten (2)?**
(1) *S.O.*
(2) *Transponder oder Pedigramm*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

4.54 Besonderheiten bei Hybriden?

- von wann bis wann galten Übergangsregelungen (1)
- Freiflug von Hybriden wie geregelt? (2)
- Meldung an wen, wenn entflohen? (3)
- Für welche Arten Gelten Hybridenverbote? (4)

(1) Als Zuchtbeginn im Sinne der zehnjährigen Übergangsfrist gilt das Vorhandensein von Eigentum zum Zwecke der Zucht Am angegebenen Stichtag des §9 BArtSchV (25.02.2005). Seit 31.12.2014 ist jede Zucht untersagt.

(2) §11 BArtSchV: Es ist verboten, Greifvogelhybriden in den Flug zu entlassen. Ausnahme: Ein, mit Telemetrie überwachter Flug außerhalb der Bettelflugperiode. Ortung und Identifizierung muss unverzüglich möglich sein. Nach dem Flug ist der Vogel sofort in ein Gehege zurückzuführen. Sobald die Identifizierung und Ortung nicht mehr möglich ist hat der Halter alle zumutbaren Maßnahmen zur Rückführung unverzüglich zu treffen.

(3) Meldung unverzüglich an die nach Landesrecht zuständige Naturschutzbehörde (UNB). Auch keine falknerische Haltung möglich

(4) §8 BArtSchV: Alle Greifvögel, die genetisch von mindestens einer heimischen Art abstammen.

4.55 Was man braucht um Beizen zu gehen?

Bea. §15 I BJagdG: Wer die Jagd mit Greifen oder Falken (Beizjagd) ausüben will, muß einen auf seinen Namen lautenden Falknerjagdschein mit sich führen.

+ *Legalen und geeigneten Greifvogel*

+ *Jagdrevier*

4.56 Wie viele Greifvögel darf man sich halten? Wo ist das festgelegt?

Insgesamt 2 Heimische (der heimischen Beizvogelarten) und unbegrenzt viele Nichtheimische. §3 II Nr. 2 BWildSchV: Wer Greife oder Falken hält, darf insgesamt nicht mehr als zwei Exemplare der Arten Habicht, Sperber, Steinadler und Wanderfalke halten,

4.57 Grösse der Volieren?

Gemäß Mindestanforderungsgutachten: Sperber 7,5m²; Habicht und Großfalken 12m²; Steinadler 24m², Mindesthöhen, Mindestbreiten, zusätzliche Flächen bei weiteren Vögeln?

4.58 BArtSchV vs BWildSchV (1)

- Wann Jagdsaison auf Fasan und Rebhuhn (2)

(1): *Nichtheimische und heimische Greifvögel*

(2): *Siehe „Jagdzeiten in Bayern“*

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

4.59 Was passiert, wenn außerhalb Jagdzeit Wild gebeizt wird?

Hat das Wild eine Jagdzeit = OWi gem. §§ 22 I; 39 II Nr. 3a BJagdG (auch fahrlässig möglich)

Hat das Wild keine Jagdzeit = Straftat gem. §§ 22 II; 38 I Nr. 2 BJagdG (auch fahrlässig möglich)

4.60 Haltung der Greifvögel wo geregelt?

Volierengrößen, Bauvorschriften, Genehmigungen

S.O.

4.61 Gesetze und Verordnungen in denen Greife behandelt werden?

Einfach aus den Lernunterlagen aufzählen. (noch einfügen)

4.62 Teilweise wurden auch die Paragraphen wo was geregelt ist abgefragt.

Ich würde eine Konkretisierung verlangen.

4.63 Angewandter Naturschutz (bsp Beizvogel schlägt unbeabsichtigt unter Naturschutz stehendes Wild)

Unverzügliche Sicherung des Beizvogels. Verständigung Polizei und untere Naturschutzbehörde. Ggf. Tierarzt. Wenn Verletzungen nicht mit dem Überleben vereinbar, dann tierschutzrechtliche Maßnahmen ergreifen. Je nach Absprache das Tier zum Zwecke der Präparation für Wissenschaft und Lehrzwecke mitnehmen und zum späteren Zeitpunkt an UNB übergeben.

4.64 Rechtliche Vorschriften zum Volierenbau?

Außenbereich, Baugenehmigung...)

Genehmigung als Wildgehege von der UJB bei heimischen Greifvögeln. Bei nichtheimischen GV braucht man eine Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde. Will man die Anlage im Außenbereich bauen oder will man im Innenbereich mehr als 75m³ Raum umbauen, braucht man eine Baugenehmigung.

Diese ist bei der Gemeinde zu beantragen. Wird eine Baugenehmigung erteilt, enthält sie gleichzeitig die Genehmigung zum Tier oder Wildgehege (keine extra Beantragung nötig) Volierengröße und Beschaffenheit gemäß Mindestanforderungsgutachten

!!! weitere Fragen aus Universal:

4.65 Wie kommen sie nach erfolgreicher Prüfung an ihren Falknerjagdschein?

Antwort

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

- 4.66 Welche Behörde stellt diesen aus und was muss man mitbringen?**
Antwort
- 4.67 Wo dürfen Sie nun mit ihrem Falknerjagdschein beizen?**
Antwort
- 4.68 Welche Größe hat in Bayern ein Eigenjagdrevier?**
Antwort
- 4.69 Wer ist Mitglied in der Jagdgenossenschaft?**
Antwort
- 4.70 Wer unterschreibt den Pachtvertrag, wenn Sie von der Jagdgenossenschaft ein Revier pachten wollen?**
Antwort
- 4.71 Kann die Vereinbarung im Pachtvertrag bezüglich der Wildarten vom Gesetz abweichen?**
Antwort
- 4.72 Wo melden Sie ihren ersten erworbenen Beizvogel (heimisch) an?**
Antwort
- 4.73 Wie viele heimische Beizvogel dürfen Sie sich aufstellen?**
Antwort
- 4.74 Wann melden Sie ihren Harris Hawk an?**
Antwort
- 4.75 Wo melden Sie ihren Harris Hawk an?**
Antwort
- 4.76 Was wissen Sie über die Hybridisierung? Was ist erlaubt?**
Antwort

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

4.77 Sie wollen einen Schadhabicht fangen, was benötigen Sie?

Antwort

4.78 Sie haben alle Genehmigungen, wie gehen Sie vor, um den Schadhabicht einzufangen?

Antwort

4.79 Wie funktioniert der Habichtskorb? Tierschutz, neben Futter und Wasser für die Taube ist hier das automatische Öffnen der Klappe zum Entfliegen der Taube gefragt)

Antwort

4.80 Wie sind Beizvogel zu kennzeichnen!

Antwort

4.81 Welche Verordnung regelt die Kennzeichnung?

Antwort

4.82 Wie kennzeichnen Sie den Schadhabicht?

Antwort

4.83 Was regelt die Bundeswildschutzverordnung?

Antwort

4.84 Was regelt die Bundesartenschutzverordnung?

Antwort

4.85 Wer beringt die Beizvogel?

Antwort

----- 2024 -----

4.86 Wie Habicht aushorsten? Wer darf im Auftrag des Falkners noch?

Antwort

Datei: Falknerei, alte Prüfungsfragen Stand 2024-01-31 Nb

4.87 Ihr Habicht hat einen Fischreiher geschlagen, dürfen Sie den verkaufen?

Antwort: Ja, aber nur wenn er innerhalb von 200m von einem Gewässer gebeizt wurde, also legal gebeizt/erlegt wurde.

4.88 Ihr Beizvogel hat eine Grau-, Nil-, oder Kanadagans geschlagen, dürfen Sie die verkaufen?

Antwort: Nein, - Begründung!

4.89 Ihr Falke schlägt einen Kolkkraben – was tun Sie?

Antwort: Ja, aber nur wenn er innerhalb von 200m von einem Gewässer gebeizt wurde, also legal gebeizt/erlegt wurde.

4.90 Wie muss ein Habichtskorb beschaffen sein? Wer prüft diesen? Dürfen Sie eine lebende Taube in den Korb tun?

Antwort:

4.91 Darf man den gefangenen Habicht wenn man ihn nicht mehr möchte verkaufen?

Antwort: Nein, nur verschenken.

4.92 Sie bekommen 500 lebende Eintagsküken, dürfen Sie diese schlachten?

Antwort: Nein, - Begründung!

4.93 Sie wollen tote Küken kaufen, lagern und verfüttern, wie gehen Sie vor?

Antwort:

FALKNERSHEIL !